

**Analisi Matematica III**  
**per il Corso di Laurea in Matematica**  
**(a.a. 2015/16)**  
**DIARIO**

Silvano Delladio

December 21, 2015

## Contents

Chapter 1. Teoria della misura	5
1. Misure esterne, prime proprietà	5
2. Misure esterne metriche, Boreliane, Borel-regolari, di Radón	7
Chapter 2. Funzioni misurabili e integrale.	13
1. Funzioni misurabili.	13
2. Integrale: definizione e prime proprietà	14
3. Teoremi di convergenza integrale	16
4. Il teorema di Fubini	18
5. La formula dell'area	21
6. Formule di Gauss-Green	25
Chapter 3. Spazi $L^p$ e serie di Fourier	33
1. Spazi $L^p$	33
2. Serie di Fourier in uno spazio di Hilbert, un prontuario minimo (meno di così non si può...)	34
3. Convergenza puntuale della serie di Fourier per una funzione regolare a tratti	37
Bibliography	39



## CHAPTER 1

### Teoria della misura

[\* Prima settimana (14/09/2015); 6 \*]

#### 1. Misure esterne, prime proprietà

DEFINIZIONE 1.1. Una “misura esterna” sull’insieme  $X$  è una mappa  $\varphi : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$  tale che

- (i)  $\varphi(\emptyset) = 0$ ;
- (ii)  $\varphi(E) \leq \varphi(F)$ , se  $E \subset F \subset X$ ;
- (iii)  $\varphi(\cup_j E_j) \leq \sum_j \varphi(E_j)$ , se  $\{E_j\}$  è una famiglia numerabile di sottoinsiemi di  $X$ .

ESEMPIO 1.1.  $X \neq \emptyset$  e

$$\varphi(E) := \begin{cases} 0 & \text{se } E = \emptyset \\ 1 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

ESEMPIO 1.2.  $X \neq \emptyset$  e  $(x_0 \in X)$

$$\varphi(E) := \begin{cases} 0 & \text{se } x_0 \notin E \\ 1 & \text{se } x_0 \in E. \end{cases}$$

ESEMPIO 1.3.  $X \neq \emptyset$  e  $\varphi(E) := \#(E)$ .

OSSERVAZIONE 1.1. La “misura superiore di Peano-Jordan” e la “misura di Peano-Jordan” non sono misure esterne.

DEFINIZIONE 1.2. Un insieme  $E \in 2^X$  è detto “misurabile (rispetto alla misura esterna  $\varphi$  su  $X$ )” se

$$(1.1) \quad \varphi(A) = \varphi(A \cap E) + \varphi(A \cap E^c)$$

per ogni  $A \in 2^X$ . La famiglia degli insiemi misurabili rispetto a  $\varphi$  è indicata con  $\mathcal{M}_\varphi$ .

OSSERVAZIONE 1.2. Grazie a (iii) di Definizione 1.1, la (1.1) si può sostituire con

$$\varphi(A) \geq \varphi(A \cap E) + \varphi(A \cap E^c).$$

ESEMPIO 1.4. Negli esempi 1.1, 1.2, 1.3 si ha rispettivamente

$$\mathcal{M}_\varphi = \{\emptyset, X\}, \quad \mathcal{M}_\varphi = 2^X, \quad \mathcal{M}_\varphi = 2^X.$$

TEOREMA 1.1 (\*\*). Per una misura esterna  $\varphi$  su  $X$ , valgono i seguenti fatti:

- (1)  $\mathcal{M}_\varphi$  è *c-chiusa*;
- (2) Se  $E \in 2^X$  è tale che  $\varphi(E) = 0$ , allora  $E \in \mathcal{M}_\varphi$ . In particolare  $\emptyset \in \mathcal{M}_\varphi$  (quindi anche  $X \in \mathcal{M}_\varphi$ );
- (3) Se  $E_1, \dots, E_n \in \mathcal{M}_\varphi$ , allora  $\bigcap_{j=1}^n E_j \in \mathcal{M}_\varphi$  (quindi anche  $\bigcup_{j=1}^n E_j \in \mathcal{M}_\varphi$ );
- (4) Se  $\{E_j\}$  è una famiglia numerabile di insiemi misurabili a-due-a-due disgiunti, allora  $S := \bigcup_j E_j \in \mathcal{M}_\varphi$ . Inoltre si ha

$$\varphi(A) \geq \sum_j \varphi(A \cap E_j) + \varphi(A \cap S^c)$$

per ogni  $A \in 2^X$ ;

- (5) (*Additività numerabile*) Se  $\{E_j\}$  è una famiglia numerabile di insiemi misurabili a-due-a-due disgiunti, si ha  $\varphi(\bigcup_j E_j) = \sum_j \varphi(E_j)$ .

**OSSERVAZIONE 1.3.** Sia data una misura esterna  $\varphi$  su  $X$  e sia  $\{E_j\}$  una famiglia numerabile di insiemi misurabili. Poniamo  $E_1^* := E_1$  e

$$E_n^* := E_n - \bigcup_{j=1}^{n-1} E_j = E_n - \bigcup_{j=1}^{n-1} E_j^* \quad (n = 2, 3, \dots).$$

Allora  $\{E_j^*\}$  è una famiglia numerabile di insiemi misurabili a-due-a-due disgiunti e si ha

$$\bigcup_{j=1}^n E_j^* = \bigcup_{j=1}^n E_j \quad (\text{per ogni } n), \quad \bigcup_j E_j^* = \bigcup_j E_j.$$

In particolare, ricordando il punto (4) di Teorema 1.1, si ha  $\bigcup_j E_j \in \mathcal{M}_\varphi$ .

**DEFINIZIONE 1.3.** Una famiglia non vuota  $\Sigma \subset 2^X$  è detta “ $\sigma$ -algebra (in  $X$ )” se gode delle seguenti proprietà:

- (i) Se  $E \in \Sigma$ , allora  $E^c \in \Sigma$ ;
- (ii) Se  $\{E_j\}$  è una famiglia numerabile di insiemi di  $\Sigma$ , si ha  $\bigcup_j E_j \in \Sigma$ .

**OSSERVAZIONE 1.4.** Se  $\Sigma$  è una  $\sigma$ -algebra in  $X$ , allora:

- (1)  $\emptyset, X \in \Sigma$ ;
- (2)  $\Sigma$  è chiusa rispetto all’operazione di intersezione numerabile.

**ESEMPIO 1.5.** Sia  $X$  un qualsiasi insieme. Allora  $2^X$  e  $\{\emptyset, X\}$  sono entrambe  $\sigma$ -algebre.

**ESEMPIO 1.6.** Se  $X := [0, 1]$  allora  $\Sigma := \{E \in 2^X \mid \#(E) \leq \aleph_0 \text{ oppure } \#(E^c) \leq \aleph_0\}$  è una  $\sigma$ -algebra.

**ESEMPIO 1.7.** Sia  $X := \mathbb{N}$ . Allora la famiglia  $\Sigma := \{E \in 2^X \mid \#(E) < \infty \text{ oppure } \#(E^c) < \infty\}$  è *c-chiusa* ma non è chiusa rispetto all’unione numerabile. Quindi  $\Sigma$  non è una  $\sigma$ -algebra.

Per Teorema 1.1 e Osservazione 1.3, vale quindi il seguente risultato.

**PROPOSIZIONE 1.1** ( $^\circ$ ). Se  $\varphi$  è una misura esterna su  $X$ , allora  $\mathcal{M}_\varphi$  è una  $\sigma$ -algebra.

**TEOREMA 1.2** ( $^{**}$ ). Se  $\varphi$  è una misura esterna su  $X$ , valgono le seguenti proprietà:

- (1) (Continuità dal basso) Se  $\{E_j\}$  è una famiglia numerabile e crescente di insiemi misurabili, si ha  $\varphi(\cup_j E_j) = \lim_j \varphi(E_j)$ .
- (2) (Continuità dall'alto) Sia  $\{E_j\}$  è una famiglia numerabile e decrescente di insiemi misurabili, con  $\varphi(E_1) < \infty$ . Allora  $\varphi(\cap_j E_j) = \lim_j \varphi(E_j)$ .

OSSERVAZIONE 1.5. Se in (2) di Teorema 1.2 non si assume l'ipotesi  $\varphi(E_1) < \infty$ , la tesi può fallire. Per esempio, se  $X := \mathbb{N}$  con  $\varphi(E) := \#(E)$ , possiamo considerare la famiglia degli  $E_j := \{j, j+1, \dots\} \in \mathcal{M}_\varphi = 2^X$ . In tal caso si ha  $\cap_j E_j = \emptyset$  e quindi  $\varphi(\cap_j E_j) = 0$ , mentre  $\varphi(E_j) = \infty$  per ogni  $j$ .

## 2. Misure esterne metriche, Boreliane, Borel-regolari, di Radón

DEFINIZIONE 2.1. Una misura esterna su uno spazio metrico  $(X, d)$  è detta “di Carathéodory” (oppure “metrica”) se

$$\varphi(A \cup B) = \varphi(A) + \varphi(B)$$

per ogni coppia di insiemi  $A, B \in 2^X$  tale che

$$\text{dist}(A, B) := \inf\{d(a, b) \mid a \in A, b \in B\} > 0.$$

[\* Seconda settimana (21/09/2015); 12 \*]

TEOREMA 2.1 (\*\*). Sia  $\varphi$  una misura esterna di Carathéodory su uno spazio metrico  $(X, d)$ . Allora ogni sottoinsieme chiuso di  $X$  è misurabile.

OSSERVAZIONE 2.1. Si può provare che vale anche il “viceversa” di Teorema 2.1: Se  $\varphi$  è una misura esterna su uno spazio metrico  $(X, d)$  e se ogni sottoinsieme chiuso di  $X$  è misurabile, allora  $\varphi$  è di Carathéodory ([11, Theorem 1.7]).

PROPOSIZIONE 2.1 (\*). Sia dato  $\mathcal{I} \subset 2^X$  e indichiamo con  $\mathcal{A}_{\mathcal{I}}$  la famiglia delle  $\sigma$ -algebre in  $X$  contenenti  $\mathcal{I}$ . Allora

$$\Sigma(\mathcal{I}) := \cap_{\Sigma \in \mathcal{A}_{\mathcal{I}}} \Sigma$$

è una  $\sigma$ -algebra in  $X$ . Essa è detta “la  $\sigma$ -algebra generata da  $\mathcal{I}$ ”.

OSSERVAZIONE 2.2. Se  $\mathcal{I}$  è una  $\sigma$ -algebra allora  $\Sigma(\mathcal{I}) = \mathcal{I}$ .

PROPOSIZIONE 2.2 (\*\*). Sia  $X$  uno spazio topologico e indichiamo con  $\mathcal{K}$ ,  $\mathcal{F}$  e  $\mathcal{G}$ , rispettivamente, la famiglia degli insiemi compatti, la famiglia degli insiemi chiusi e la famiglia degli insiemi aperti di  $X$ . Allora:

- (1) Si ha  $\Sigma(\mathcal{F}) = \Sigma(\mathcal{G})$ ;
- (2) Se  $X$  è uno spazio di Hausdorff, vale l'inclusione  $\Sigma(\mathcal{K}) \subset \Sigma(\mathcal{F})$ ;
- (3) Se  $(X, d)$  è uno spazio metrico separabile, si ha  $\Sigma(\mathcal{K}) = \Sigma(\mathcal{G})$  (dimostrato nel caso particolare dello spazio Euclideo; per una trattazione del caso generale si può vedere [12]).

OSSERVAZIONE 2.3. In uno spazio topologico che non sia metrico e separabile può effettivamente accadere che  $\Sigma(\mathcal{K}) \neq \Sigma(\mathcal{F}) = \Sigma(\mathcal{G})$ . Si consideri per esempio  $X := [0, 1]$  con la topologia discreta e cioè  $\mathcal{G} := 2^{[0,1]}$ . Osserviamo che  $\mathcal{K}$  coincide con la famiglia dei sottoinsiemi finiti di  $[0, 1]$ . Se consideriamo la  $\sigma$ -algebra

$$\Sigma_0 := \{E \in 2^X \mid \#(E) \leq \aleph_0 \text{ oppure } \#(E^c) \leq \aleph_0\}$$

introdotta in Esempio 1.6, si ha  $\Sigma(\mathcal{K}) \subset \Sigma_0 \subset 2^{[0,1]}$ . Inoltre, evidentemente, vale  $\Sigma_0 \neq 2^{[0,1]} = \mathcal{G} = \Sigma(\mathcal{G})$ .

DEFINIZIONE 2.2. Siano  $X$  uno spazio topologico,  $\varphi$  una misura esterna su  $X$  e  $\mathcal{M}_\varphi$  la  $\sigma$ -algebra degli insiemi misurabili rispetto a  $\varphi$ . Allora:

- (i) La  $\sigma$ -algebra  $\Sigma(\mathcal{F}) = \Sigma(\mathcal{G})$  viene indicata con  $\mathcal{B}(X)$  e i suoi elementi sono detti “insiemi Boreliani”;
- (ii)  $\varphi$  è detta “Boreliana” (oppure “di Borel”) se  $\mathcal{B}(X) \subset \mathcal{M}_\varphi$ ;
- (iii)  $\varphi$  è detta “Borel regolare” se è Boreliana e se inoltre per ogni insieme  $A \in 2^X$  esiste  $B \in \mathcal{B}(X)$  tale che  $B \supset A$  e  $\varphi(B) = \varphi(A)$ ;
- (iv)  $\varphi$  è detta “di Radón” se è Borel regolare e se  $\varphi(K) < \infty$  per ogni insieme compatto  $K$  in  $X$ .

Da Teorema 2.1 segue subito il seguente risultato.

COROLLARIO 2.1 ( $^\circ$ ). Ogni misura esterna di Carathéodory su uno spazio metrico è Boreliana.

LEMMA 2.1 (\*). Consideriamo uno spazio topologico  $X$  e sia  $\mathcal{D} \subset 2^X$  tale che:

- (i)  $\mathcal{F}, \mathcal{G} \subset \mathcal{D}$ ;
- (ii)  $\mathcal{D}$  è chiuso rispetto all'unione numerabile e rispetto all'intersezione numerabile.

Allora  $\mathcal{B}(X) \subset \mathcal{D}$ .

TEOREMA 2.2 (\*\*). Sia  $\varphi$  una misura esterna Boreliana su uno spazio metrico  $(X, d)$  e sia  $B \in \mathcal{B}(X)$ . Si verificano i seguenti fatti:

- (1) Se  $\varphi(B) < \infty$ , allora per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste un insieme chiuso  $F$  tale che  $F \subset B$  e  $\varphi(B - F) \leq \varepsilon$ ;
- (2) Se  $B \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} V_j$ , dove i  $V_j$  sono insiemi aperti tali che  $\varphi(V_j) < \infty$ , allora per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste un insieme aperto  $G \supset B$  tale che  $\varphi(G - B) \leq \varepsilon$ .

COROLLARIO 2.2 (\*\*). Sia  $\varphi$  una misura esterna Borel regolare su uno spazio metrico  $(X, d)$  e sia  $E \in \mathcal{M}_\varphi$ . Si verificano i seguenti fatti:

- (1) Se  $\varphi(E) < \infty$ , allora per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste un insieme chiuso  $F$  tale che  $F \subset E$  e  $\varphi(E - F) \leq \varepsilon$ ;

- (2) Se  $E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} V_j$ , dove i  $V_j$  sono insiemi aperti tali che  $\varphi(V_j) < \infty$ , allora per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste un insieme aperto  $G \supset E$  tale che  $\varphi(G - E) \leq \varepsilon$ .

TEOREMA 2.3 (\*\*). Si consideri la funzione  $\mathcal{L}^n : 2^{\mathbb{R}^n} \rightarrow [0, +\infty]$  definita da

$$\mathcal{L}^n(E) := \inf \left\{ \sum_j v(I_j) \mid \{I_j\} \in \mathcal{R}(E) \right\} \quad (E \subset \mathbb{R}^n)$$

dove  $\mathcal{R}(E)$  indica la famiglia dei ricoprimenti numerabili di  $E$  costituiti di intervalli aperti in  $\mathbb{R}^n$ , mentre  $v(I_j)$  denota la misura elementare dell'intervallo  $I_j$ . Allora  $\mathcal{L}^n$  è una misura esterna metrica ed è di Radón.

[\* Terza settimana (28/09/2015); 18 \*]

DEFINIZIONE 2.3. La misura esterna  $\mathcal{L}^n$  definita in Teorema 2.3 è detta “misura esterna di Lebesgue  $n$ -dimensionale”.

Il seguente risultato elenca alcune proprietà della misura esterna di Lebesgue.

TEOREMA 2.4 (\*\*). Valgono i seguenti fatti:

- (1) Per ogni  $a \in \mathbb{R}^n$  si ha  $\mathcal{L}^n(\{a\}) = 0$ ;
- (2) Se  $I$  è un intervallo aperto in  $\mathbb{R}^n$ , si ha  $\mathcal{L}^n(I) = v(I)$ ;
- (3) Per ogni  $E \subset \mathbb{R}^n$  e per ogni  $\tau \in \mathbb{R}^n$  si ha:
  - $\mathcal{L}^n(E + \tau) = \mathcal{L}^n(E)$ ;
  - Se  $E \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}^n}$  allora  $E + \tau \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}^n}$ ;
- (4) Per ogni  $E \subset \mathbb{R}^n$  e per ogni  $\rho \in \mathbb{R}^+$  si ha:
  - $\mathcal{L}^n(\rho E) = \rho^n \mathcal{L}^n(E)$ ;
  - Se  $E \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}^n}$  allora  $\rho E \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}^n}$ ;

ESEMPIO 2.1. Si ha  $\mathcal{L}^n(\mathbb{Q}^n) = 0$ . L'insieme  $\mathbb{Q}^n$  è misurabile.

ESEMPIO 2.2 (Esistenza di insiemi non misurabili). Consideriamo la seguente relazione di equivalenza in  $[0, 1]$ :  $x \sim y$  se  $x - y \in \mathbb{Q}$ . Grazie all'assioma della scelta possiamo poi “costruire” un insieme  $E$  di rappresentanti delle classi di equivalenza. Se  $\mathbb{Q} \cap [0, 1) = \{q_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ , poniamo infine

$$E_i := (E \cap [0, q_i] + 1 - q_i) \cup (E \cap (q_i, 1] - q_i).$$

Allora  $E$  non è misurabile. Se lo fosse, lo sarebbero anche tutti gli  $E_i$ . Poiché questi sono a-due-a-due disgiunti e si ha

$$(0, 1] \subset \bigcup_i E_i \subset [0, 1]$$

si giungerebbe all'assurdo:

$$1 = \mathcal{L}^1\left(\bigcup_i E_i\right) = \sum_i \mathcal{L}^1(E_i) = \sum_i \mathcal{L}^1(E).$$

OSSERVAZIONE 2.4. Senza l'assioma della scelta è impossibile provare l'esistenza di insiemi non misurabili (Solovay, 1970).

OSSERVAZIONE 2.5. Utilizzando l'insieme di Cantor si può provare che esistono sottoinsiemi di  $\mathbb{R}$  che sono misurabili rispetto a  $\mathcal{L}^1$  ma non sono Boreliani. Indicato con  $C$  l'insieme di Cantor e ricordando che  $\mathcal{L}^1(C) = 0$ , si ha infatti  $2^C \subset \mathcal{M}_{\mathcal{L}^1}$  e quindi anche

$$\text{card}(\mathbb{R}) = \text{card}(C) < \text{card}(2^C) \leq \text{card}(\mathcal{M}_{\mathcal{L}^1}).$$

A questo punto la conclusione segue subito dal fatto che  $\text{card}(\mathcal{B}(\mathbb{R})) = \text{card}(\mathbb{R})$ , per la dimostrazione del quale rimandiamo a [14].

TEOREMA 2.5 (\*). Dati  $E \subset \mathbb{R}^n$  e  $\delta > 0$ , indichiamo con  $\mathcal{R}_\delta(E)$  la famiglia dei ricoprimenti numerabili  $\{C_j\}$  di  $E$  tali che  $0 < \text{diam}(C_j) \leq \delta$  per ogni  $j$ . Per  $s \in [0, +\infty)$ , poniamo anche

$$\alpha(s) := \frac{\pi^{s/2}}{\Gamma\left(\frac{s}{2} + 1\right)}, \quad \Gamma(t) := \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{t-1} dx.$$

Allora la funzione  $\mathcal{H}_\delta^s : 2^{\mathbb{R}^n} \rightarrow [0, \infty]$  definita da

$$\mathcal{H}_\delta^s(E) := \begin{cases} 0 & \text{se } E = \emptyset \\ \inf \left\{ \sum_j \alpha(s) \left( \frac{\text{diam } C_j}{2} \right)^s \mid \{C_j\} \in \mathcal{R}_\delta(E) \right\} & \text{se } E \neq \emptyset. \end{cases}$$

è una misura esterna.

TEOREMA 2.6 (\*\*). Sia  $s \in [0, +\infty)$  e  $E \subset \mathbb{R}^n$ . Allora la funzione  $\delta \mapsto \mathcal{H}_\delta^s(E)$  è monotona decrescente, quindi esiste

$$\mathcal{H}^s(E) := \lim_{\delta \downarrow 0} \mathcal{H}_\delta^s(E).$$

La mappa  $\mathcal{H}^s : 2^{\mathbb{R}^n} \rightarrow [0, +\infty]$  è una misura esterna metrica e Borel regolare. Essa è detta “misura esterna di Hausdorff  $s$ -dimensionale (in  $\mathbb{R}^n$ )”.

Alcune ulteriori proprietà della misura esterna di Hausdorff sono raccolte in questo teorema di cui non proviamo il punto (2). Per la dimostrazione di tale fatto, ci si può riferire a [3].

TEOREMA 2.7 (\*). Si ha:

- (1)  $\mathcal{H}^0 = \#$  (misura del conteggio);
- (2)  $\mathcal{H}^n = \mathcal{L}^n$  (in  $\mathbb{R}^n$ );
- (3) Per ogni  $E \subset \mathbb{R}^n$  e per ogni  $\tau \in \mathbb{R}^n$  si ha:
  - $\mathcal{H}^s(E + \tau) = \mathcal{H}^s(E)$ ;
  - Se  $E \in \mathcal{M}_{\mathcal{H}^s}$  allora  $E + \tau \in \mathcal{M}_{\mathcal{H}^s}$ ;
- (4) Per ogni  $E \subset \mathbb{R}^n$  e per ogni  $\rho \in \mathbb{R}^+$  si ha:
  - $\mathcal{H}^s(\rho E) = \rho^s \mathcal{H}^s(E)$ ;
  - Se  $E \in \mathcal{M}_{\mathcal{H}^s}$  allora  $\rho E \in \mathcal{M}_{\mathcal{H}^s}$ ;

Attraverso le proprietà della misura di Hausdorff si può definire una nozione di dimensione per i sottoinsiemi di  $\mathbb{R}^n$ .

PROPOSIZIONE 2.3 (\*). Se  $\mathcal{H}^s(E) < +\infty$ , con  $E \subset \mathbb{R}^n$  e  $s \geq 0$ , allora  $\mathcal{H}^t(E) = 0$  per ogni  $t > s$ . Inoltre, per ogni  $t > n$  si ha  $\mathcal{H}^t(\mathbb{R}^n) = 0$ . Conseguentemente, per ogni  $E \subset \mathbb{R}^n$ , l'insieme

$$R(E) := \{t \in [0, +\infty) \mid \mathcal{H}^t(E) = 0\}$$

è una semiretta destra che include  $(n, +\infty)$ . La “dimensione di Hausdorff” dell'insieme  $E \subset \mathbb{R}^n$  è definita come il numero

$$\dim_H(E) := \inf R(E) \leq n.$$

[\* Quarta settimana (05/10/2015); 24 \*]

COROLLARIO 2.3 (\*). La misura esterna di Hausdorff  $\mathcal{H}^s$  in  $\mathbb{R}^n$  non è di Radón, eccetto che per  $s \geq n$ .

ESEMPIO 2.3. Sia  $C$  l'insieme di Cantor. Se esiste  $s$  tale che  $\mathcal{H}^s(C) \in (0, +\infty)$  allora  $s = \ln 2 / \ln 3$ . Questo ci consente di “scommettere” che  $C$  abbia dimensione di Hausdorff pari a  $\ln 2 / \ln 3$ . Per una dimostrazione completa di tale fatto vedasi [4, Theorem 1.14]).

DEFINIZIONE 2.4. Sia  $X$  un insieme e  $\mathcal{A}$  una  $\sigma$ -algebra in  $X$ . Allora, una “misura su  $\mathcal{A}$ ” è una funzione  $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$  tale che:

- (i)  $\mu(\emptyset) = 0$ ;
- (ii) se  $\{E_j\}$  è una famiglia numerabile di insiemi in  $\mathcal{A}$  a-due-a-due disgiunti, allora  $\mu(\cup_j E_j) = \sum_j \mu(E_j)$ .

La terna  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  è detta “spazio con misura”.

Come conseguenza di Teorema 1.1 e Proposizione 1.1, otteniamo subito il seguente risultato.

PROPOSIZIONE 2.4 (°). Se  $\varphi$  è una misura esterna sull'insieme  $X$ , allora  $(X, \mathcal{M}_\varphi, \varphi|_{\mathcal{M}_\varphi})$  è uno spazio con misura.

ESEMPIO 2.4. La “misura di Lebesgue”  $\mathcal{L}^n|_{\mathcal{M}_{\mathcal{L}^n}}$  e la “misura di Hausdorff”  $\mathcal{H}^s|_{\mathcal{M}_{\mathcal{H}^s}}$ . Per semplicità esse sono indicate con  $\mathcal{L}^n$  and  $\mathcal{H}^s$ , rispettivamente.

OSSERVAZIONE 2.6. Ci si può chiedere se una misura provenga sempre da una misura esterna nel modo indicato in Proposizione 2.4. Una risposta quasi affermativa è data dal seguente risultato (vedasi [8, Theorem 4.47]): Se  $(X, \mathcal{A}, \mu)$   $\mu$  è uno spazio con misura, allora esiste una misura esterna  $\varphi$  su  $X$  tale che  $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}_\varphi$  e  $\varphi|_{\mathcal{A}} = \mu$ .



## CHAPTER 2

### Funzioni misurabili e integrale.

#### 1. Funzioni misurabili.

DEFINIZIONE 1.1. Siano  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  e  $(Y, \tau)$ , rispettivamente, uno spazio con misura e uno spazio topologico. Allora una funzione  $f : X \rightarrow Y$  si dice “misurabile” se per ogni  $G \in \tau$  si ha  $f^{-1}(G) \in \mathcal{A}$ .

OSSERVAZIONE 1.1. Consideriamo uno spazio misurabile  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  e supponiamo che  $X$  sia anche uno spazio topologico con la topologia inclusa in  $\mathcal{A}$ . Inoltre, siano  $Y$  uno spazio topologico e  $f : X \rightarrow Y$  una funzione continua. Allora  $f$  è misurabile. Esempi di situazioni di questo tipo sono:

- $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}_{\mathcal{L}^n}, \mathcal{L}^n|_{\mathcal{M}_{\mathcal{L}^n}}), f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  continua;
- $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}_{\mathcal{H}^s}, \mathcal{H}^s|_{\mathcal{M}_{\mathcal{H}^s}}), f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  continua.

PROPOSIZIONE 1.1 ( $^\circ$ ). Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura e siano  $Y, Z$  spazi topologici. Supponiamo inoltre che  $f : X \rightarrow Y$  e  $g : Y \rightarrow Z$  siano, rispettivamente, una funzione misurabile e una funzione continua. Allora  $g \circ f : X \rightarrow Z$  è una funzione misurabile.

PROPOSIZIONE 1.2 (\*\*). Siano dati uno spazio con misura  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  e una funzione  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ . Allora le seguenti affermazioni sono fra di loro equivalenti:

- (1)  $f$  è misurabile;
- (2)  $f^{-1}((a, +\infty]) \in \mathcal{A}$  per ogni  $a \in \mathbb{R}$ ;
- (3)  $f^{-1}([a, +\infty]) \in \mathcal{A}$  per ogni  $a \in \mathbb{R}$ ;
- (4)  $f^{-1}([-\infty, a)) \in \mathcal{A}$  per ogni  $a \in \mathbb{R}$ ;
- (5)  $f^{-1}([-\infty, a]) \in \mathcal{A}$  per ogni  $a \in \mathbb{R}$ .

TEOREMA 1.1 (\*\*). Se  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  è uno spazio con misura, valgono le seguenti proprietà:

- (1) Siano  $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  misurabili. Allora  $f + g$  (escludendo che si verifichi  $\infty - \infty$ ),  $|f|$ ,  $fg$ ,  $\max\{f, g\}$  e  $\min\{f, g\}$  sono misurabili. Se  $g(x) \neq 0$  per ogni  $x \in X$ , la funzione  $f/g$  è misurabile.
- (2) Sia data una successione di funzioni misurabili  $f_k : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  ( $k = 1, 2, \dots$ ). Allora le funzioni  $\inf_k f_k$ ,  $\sup_k f_k$ ,  $\liminf_k f_k$  e  $\limsup_k f_k$  sono misurabili.

## 2. Integrale: definizione e prime proprietà

DEFINIZIONE 2.1. Sia  $X$  un insieme. Una funzione  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  si dice “numerabilmente semplice” se  $\text{Im}(f)$  è numerabile.

DEFINIZIONE 2.2. Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura e indichiamo con  $\Sigma$  la famiglia delle funzioni numerabilmente semplici e misurabili  $\varphi : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ . Allora:

(i) Se  $\varphi \in \Sigma$  e  $\varphi \geq 0$ , poniamo

$$I_\mu(\varphi) := \sum_i a_i \mu(E_i); \quad \{a_i\} = \text{Im}(\varphi), \quad E_i := \varphi^{-1}(\{a_i\})$$

dove si assume per convenzione che  $0 \cdot \infty = \infty \cdot 0 = 0$ ;

(ii) Sia  $\Sigma^*$  la famiglia delle funzioni  $\varphi \in \Sigma$  tali che almeno uno di  $I_\mu(\varphi \vee 0)$  e  $I_\mu((-\varphi) \vee 0)$  sia finito. Se  $\varphi \in \Sigma^*$  allora poniamo

$$I_\mu(\varphi) := I_\mu(\varphi \vee 0) - I_\mu((-\varphi) \vee 0).$$

PROPOSIZIONE 2.1 (\*). Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura. Allora

$$I_\mu(\varphi) \leq I_\mu(\psi)$$

per ogni  $\varphi, \psi \in \Sigma^*$  tali che  $\varphi(x) \leq \psi(x)$  per  $\mu$ -q.o.  $x \in X$ . Di conseguenza, se consideriamo una funzione  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  e poniamo

$$\Sigma_-(f) := \{\varphi \in \Sigma^* \mid \varphi \leq f \text{ } \mu\text{-q.o.}\}, \quad \Sigma_+(f) := \{\varphi \in \Sigma^* \mid \varphi \geq f \text{ } \mu\text{-q.o.}\}$$

allora vale la disuguaglianza

$$\sup\{I_\mu(\varphi) \mid \varphi \in \Sigma_-(f)\} \leq \inf\{I_\mu(\varphi) \mid \varphi \in \Sigma_+(f)\}.$$

DEFINIZIONE 2.3. Siano dati uno spazio con misura  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  e una funzione  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ . Allora:

(i) L’“integrale superiore di  $f$ ” è dato da

$$\int^* f d\mu := \inf\{I_\mu(\varphi) \mid \varphi \in \Sigma_+(f)\}$$

mentre l’“integrale inferiore di  $f$ ” è

$$\int_* f d\mu := \sup\{I_\mu(\varphi) \mid \varphi \in \Sigma_-(f)\}.$$

(N.B. Si ha  $\int_* f d\mu \leq \int^* f d\mu$ , per Proposizione 2.1)

(ii) Si dice che “ $f$  è integrabile” se  $f$  è misurabile e gli integrali inferiore e superiore di  $f$  sono uguali. In tal caso si definisce l’“integrale di  $f$ ” come segue

$$\int f d\mu := \int^* f d\mu = \int_* f d\mu.$$

(iii) Si dice che “ $f$  è sommabile” se  $f$  è integrabile e  $\int f d\mu$  è finito.

OSSERVAZIONE 2.1. Siano dati uno spazio con misura  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  e due funzioni misurabili  $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  tali che  $f = g$   $\mu$ -q.o. Allora si ha

$$\Sigma_-(f) = \Sigma_-(g), \quad \Sigma_+(f) = \Sigma_+(g)$$

e quindi

$$\int_* f d\mu = \int_* g d\mu, \quad \int^* f d\mu = \int^* g d\mu.$$

In particolare,  $f$  è integrabile se e solo se  $g$  è integrabile. In tal caso si ha

$$\int f d\mu = \int g d\mu.$$

Il seguente risultato elenca le prime proprietà dell'integrale, ben note nella trattazione elementare.

TEOREMA 2.1 (\*\*\*) . *Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura. Valgono le seguenti proprietà:*

- (1) *Se  $\varphi \in \Sigma^*$  allora  $\varphi$  è integrabile e si ha  $\int \varphi d\mu = I_\mu(\varphi)$ . In particolare, se  $I_\mu(\varphi)$  è finito allora  $\varphi$  è sommabile;*
- (2) *Una funzione sommabile è finita  $\mu$ -q.o.;*
- (3) *Se  $f, g$  sono funzioni sommabili e  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , allora  $\alpha f + \beta g$  è sommabile e si ha*

$$\int (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int f d\mu + \beta \int g d\mu;$$

- (4) *Se  $f, g$  sono due funzioni integrabili tali che  $f \leq g$   $\mu$ -q.o., allora*

$$\int f d\mu \leq \int g d\mu;$$

- (5) *Se  $f$  è una funzione sommabile e  $A \in \mathcal{A}$ , allora  $f\chi_A$  è una funzione sommabile;*
- (6) *Una funzione misurabile  $f$  è sommabile se e soltanto se  $|f|$  è una funzione sommabile;*
- (7) *Se  $f$  è una funzione sommabile, allora*

$$\left| \int f d\mu \right| \leq \int |f| d\mu.$$

[\* Quinta settimana (12/10/2015); 30 \*]

DEFINIZIONE 2.4. *Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura. Se  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  è una funzione misurabile e se  $A \in \mathcal{A}$ , allora:*

- (i) *Se  $f\chi_A$  è integrabile, si dice che “ $f$  è integrabile in  $A$ ” e si pone*

$$\int_A f d\mu := \int f\chi_A d\mu;$$

- (ii) *Si dice che “ $f$  è sommabile in  $A$ ” se  $f\chi_A$  è sommabile.*

OSSERVAZIONE 2.2. Nelle ipotesi di Definizione 2.4, si ha che  $f$  è integrabile (risp. sommabile) in  $X$  se e solo se  $f$  è integrabile (risp. sommabile). In tal caso si ha  $\int_X f d\mu = \int f d\mu$ . Inoltre, se  $A \in \mathcal{A}$  allora la funzione 1 è integrabile in  $A$  e vale  $\int_A 1 d\mu = \mu(A)$ .

Vale il seguente teorema che manifesta la maggior “versatilità” di questa teoria dell’integrazione rispetto a quella elementare di Riemann.

TEOREMA 2.2 (\*\*). *Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura e consideriamo una funzione misurabile  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  tale che  $f \geq 0$   $\mu$ -q.o. Allora  $f$  è integrabile.*

COROLLARIO 2.1 (\*). *Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura. Siano  $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ , rispettivamente, una funzione misurabile e una funzione sommabile soddisfacenti  $|f| \leq |g|$   $\mu$ -q.o. Allora  $f$  è sommabile.*

Vale anche questo facile (e intuitivo) risultato che ci sarà utile in seguito.

PROPOSIZIONE 2.2 (\*). *Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura e sia  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  una funzione misurabile tale che  $f \geq 0$   $\mu$ -q.o. e  $\int_X f d\mu = 0$ . Allora  $f = 0$   $\mu$ -q.o.*

Quanto al confronto fra l’integrale di Lebesgue e l’integrale di Riemann, vale il seguente risultato (solo enunciato, dimostrazione e.g. in [8, Theorem 6.16]).

TEOREMA 2.3. *Una funzione limitata  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  è integrabile secondo Riemann se e solo se  $f$  è continua  $\mathcal{L}^1$ -q.o. in  $[a, b]$ . In tal caso l’integrale di Riemann di  $f$  coincide con  $\int_{[a,b]} \tilde{f} d\mathcal{L}^1$ , dove  $\tilde{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  è l’estensione di  $f$  che vale zero in  $\mathbb{R} \setminus [a, b]$ .*

### 3. Teoremi di convergenza integrale

TEOREMA 3.1 (Lemma di Fatou (\*\*\*)). *Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura e consideriamo una successione di funzioni misurabili  $f_k : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  tali che  $f_k \geq 0$   $\mu$ -q.o. Allora*

$$\int \liminf_k f_k d\mu \leq \liminf_k \int f_k d\mu.$$

OSSERVAZIONE 3.1. Il seguente esempio mostra come, in generale, nel Lemma di Fatou possa valere la disuguaglianza stretta. Consideriamo lo spazio con misura  $(\mathbb{R}, \mathcal{M}_{\mathcal{L}^1}, \mathcal{L}^1|_{\mathcal{M}_{\mathcal{L}^1}})$  e la successione di funzioni

$$f_k := k\chi_{(0,1/k)} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (k = 1, 2, \dots).$$

Si vede subito che tale successione converge ovunque alla funzione  $f := 0$ , mentre si ha

$$\int f_k d(\mathcal{L}^1|_{\mathcal{M}_{\mathcal{L}^1}}) = \int_{(0,1/k)} k d(\mathcal{L}^1|_{\mathcal{M}_{\mathcal{L}^1}}) = 1$$

per ogni  $k$ . Quindi

$$\int f d(\mathcal{L}^1|_{\mathcal{M}_{\mathcal{L}^1}}) = 0 < 1 = \liminf_k \int f_k d(\mathcal{L}^1|_{\mathcal{M}_{\mathcal{L}^1}}).$$

TEOREMA 3.2 (Convergenza monotona (\*)). Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura e consideriamo una successione di funzioni misurabili  $f_k : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  tali che  $f_{k+1} \geq f_k \geq 0$   $\mu$ -q.o. Allora

$$\lim_k \int f_k d\mu = \int \lim_k f_k d\mu.$$

[\* Sesta settimana (19/10/2015); 36 \*]

COROLLARIO 3.1 ( $\circ$ ). Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura e consideriamo una successione di funzioni misurabili  $f_k : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  tali che  $f_k \geq 0$   $\mu$ -q.o. Allora

$$\int \sum_k f_k d\mu = \sum_k \int f_k d\mu.$$

TEOREMA 3.3 (Convergenza dominata (\*\*)). Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura. Consideriamo:

- (i) Una successione di funzioni misurabili  $f_k : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  che converge  $\mu$ -q.o. a  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ;
- (ii) Una funzione sommabile  $g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  tale che  $|f_k| \leq g$   $\mu$ -q.o., per ogni  $k$ .

Allora ogni  $f_k$  e  $f$  sono sommabili e vale

$$\lim_k \int |f_k - f| d\mu = 0.$$

In particolare

$$\lim_k \int f_k d\mu = \int f d\mu.$$

OSSERVAZIONE 3.2. L' esempio presentato in Osservazione 3.1 mostra anche che, senza l'ipotesi di dominazione, la conclusione di Teorema 3.3 può essere falsa. Infatti in questo caso si ha

$$\int |f_k - f| d(\mathcal{L}^1|_{\mathcal{M}_{\mathcal{L}^1}}) = \int_{(0,1/k)} k d(\mathcal{L}^1|_{\mathcal{M}_{\mathcal{L}^1}}) = 1$$

per ogni  $k$ . Quindi

$$\lim_k \int |f_k - f| d(\mathcal{L}^1|_{\mathcal{M}_{\mathcal{L}^1}}) = 1 \neq 0.$$

COROLLARIO 3.2 (\*). Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura e  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  una funzione sommabile. Allora la funzione  $\nu_f : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$  definita come segue

$$(3.1) \quad \nu_f(A) := \int f \chi_A d\mu = \int_A f d\mu, \quad A \in \mathcal{A}$$

è una misura con segno, i.e.

- (i) Si ha  $\nu_f(\emptyset) = 0$ ;

(ii) Se  $\{A_i\}$  è una famiglia numerabile di elementi a-due-a-due disgiunti di  $\mathcal{A}$ , allora

$$\nu_f(\cup_i A_i) = \sum_i \nu_f(A_i)$$

e tale serie converge assolutamente.

Inoltre  $\nu_f$  è assolutamente continua rispetto a  $\mu$ , ossia: se  $\mu(A) = 0$ , con  $A \in \mathcal{A}$ , allora  $\nu_f(A) = 0$ .

OSSERVAZIONE 3.3. Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura e sia  $\nu : \mathcal{A} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  una misura con segno assolutamente continua rispetto a  $\mu$  (ossia: se  $\mu(A) = 0$ , con  $A \in \mathcal{A}$ , allora  $\nu(A) = 0$ ). Sorge spontaneamente la seguente questione: è vero che  $\nu$  si può rappresentare nella forma integrale (3.2)? Ebbene, a tale questione risponde affermativamente il teorema di Radon Nikodym. Esso afferma che esiste una funzione integrabile  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  tale che  $\nu_f = \nu$ . Per una dimostrazione di tale importante risultato si può consultare, per esempio, [8, Section 6.6].

[\* Settima settimana (26/10/2015); 42 \*]

#### 4. Il teorema di Fubini

PROPOSIZIONE 4.1 (\*). Siano  $X, Y$  insiemi, siano

$$\mu : 2^X \rightarrow [0, +\infty], \quad \nu : 2^Y \rightarrow [0, +\infty]$$

due misure esterne e poniamo

$$\mathcal{R} := \mathcal{M}_\mu \times \mathcal{M}_\nu = \{A \times B \mid A \in \mathcal{M}_\mu, B \in \mathcal{M}_\nu\}.$$

Inoltre, se  $E \subset X \times Y$ , sia  $\mathcal{R}(E)$  la famiglia di tutti i ricoprimenti numerabili  $\{R_i\}_i$  di  $E$  con  $R_i \in \mathcal{R}$ . Allora la funzione

$$\mu \times \nu : 2^{X \times Y} \rightarrow [0, +\infty]$$

definita come segue ( $E \subset X \times Y$ )

$$(\mu \times \nu)(E) := \inf \left\{ \sum_j \mu(A_j) \nu(B_j) \mid \{A_j \times B_j\} \in \mathcal{R}(E) \right\}$$

è una misura esterna.

Per le misure di Lebesgue vale il seguente risultato.

PROPOSIZIONE 4.2 (\*\*). Per ogni coppia di numeri interi positivi  $m, n$  si ha

$$\mathcal{L}^m \times \mathcal{L}^n = \mathcal{L}^{m+n}.$$

Premettiamo agli enunciati dei prossimi due lemmi un pò di notazione e alcune ipotesi comuni.

Prima di tutto, come in Proposizione 4.1, siano date due misure esterne

$$\mu : 2^X \rightarrow [0, +\infty], \quad \nu : 2^Y \rightarrow [0, +\infty]$$

e definiamo

$$\mathcal{R} := \mathcal{M}_\mu \times \mathcal{M}_\nu = \{A \times B \mid A \in \mathcal{M}_\mu, B \in \mathcal{M}_\nu\}.$$

Se  $S \in 2^{X \times Y}$  e  $x \in X$ , poniamo

$$S_x := \{y \in Y \mid (x, y) \in S\}.$$

Infine, sia

$$\mathcal{F} := \left\{ S \in 2^{X \times Y} \mid S_x \in \mathcal{M}_\nu \text{ per } \mu\text{-q.o. } x \in X \text{ e } x \mapsto \nu(S_x) \text{ è } \mu\text{-misurabile} \right\}$$

e definiamo

$$\rho : \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty], \quad \rho(S) := \int \nu(S_x) d\mu.$$

LEMMA 4.1 (\*\*\*). *Valgono i seguenti fatti:*

- (1) Se  $A \times B \in \mathcal{R}$  allora  $A \times B \in \mathcal{F}$  (cioè  $\mathcal{R} \subset \mathcal{F}$ ) e  $\rho(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ ;
- (2) Se  $S, T \in \mathcal{F}$  e  $S \subset T$  allora  $\rho(S) \leq \rho(T)$ ;
- (3) Se  $\{S_j\}$  è una famiglia numerabile di insiemi di  $\mathcal{F}$  a-due-a-due disgiunti, allora

$$\cup_j S_j \in \mathcal{F}, \quad \rho(\cup_j S_j) = \sum_j \rho(S_j);$$

- (4) Se  $\{R_j\}$  è una famiglia numerabile di insiemi di  $\mathcal{R}$ , allora

$$\cup_j R_j \in \mathcal{F} \text{ (quindi } \mathcal{R}_\sigma \subset \mathcal{F}\text{)}, \quad \rho(\cup_j R_j) \leq \sum_j \rho(R_j).$$

Inoltre, se  $\mu$  e  $\nu$  sono  $\sigma$ -finite:

- (5) Si ha  $\mathcal{R}_{\sigma\delta} \subset \mathcal{F}$ ;
- (6) Per ogni  $S \in 2^{X \times Y}$  esiste  $E \in \mathcal{R}_{\sigma\delta}$  tale che

$$E \supset S, \quad \rho(E) = (\mu \times \nu)(S).$$

Nel caso particolare che  $S \in \mathcal{R}_{\sigma\delta}$  si ha

$$\rho(S) = (\mu \times \nu)(S);$$

- (7) Se  $S \in 2^{X \times Y}$  soddisfa  $(\mu \times \nu)(S) = 0$ , allora  $S \in \mathcal{F}$  e  $\rho(S) = 0$ ;
- (8) Si ha  $\mathcal{R} \subset \mathcal{M}_{\mu \times \nu}$ ;
- (9) Si ha  $\mathcal{M}_{\mu \times \nu} \subset \mathcal{F}$  e per ogni  $S \in \mathcal{M}_{\mu \times \nu}$  si ha  $\rho(S) = (\mu \times \nu)(S)$ .

OSSERVAZIONE 4.1. Con riferimento al punto (9) di Lemma 4.1, potremmo chiederci se valga la proprietà più forte che

$$S_x \in \mathcal{M}_\nu \text{ per ogni } x \in X, \text{ tutte le volte che } S \in \mathcal{M}_{\mu \times \nu}.$$

Ebbene, in generale questo non è vero. Per provarlo, consideriamo l'insieme  $E \notin \mathcal{M}_{\mathcal{L}^1}$  costruito in Esempio 2.2 e definiamo

$$S := \{0\} \times E \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Poiché  $(\mathcal{L}^1 \times \mathcal{L}^1)(S) = \mathcal{L}^2(S) = 0$ , si ha che  $S \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}^1 \times \mathcal{L}^1}$  (per (2) di Teorema 1.1). Tuttavia  $S_0 = E \notin \mathcal{M}_{\mathcal{L}^1}$ .

TEOREMA 4.1 (\*\*). *Supponiamo che  $\mu, \nu$  siano  $\sigma$ -finite e sia  $f(x, y) : X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  una funzione  $(\mu \times \nu)$ -sommabile in  $S \in \mathcal{M}_{\mu \times \nu}$ . Allora:*

- $S_x := \{y \in Y \mid (x, y) \in S\} \in \mathcal{M}_\nu$ , per  $\mu$ -q.o.  $x \in X$ ;
- $y \mapsto f(x, y)$  è  $\nu$ -sommabile in  $S_x$ , per  $\mu$ -q.o.  $x \in X$ ;
- $x \mapsto \int_{S_x} f(x, y) d\nu(y)$  è  $\mu$ -sommabile;
- vale l'uguaglianza

$$\int_S f d(\mu \times \nu) = \int_X \left[ \int_{S_x} f(x, y) d\nu(y) \right] d\mu(x).$$

Naturalmente, lo stesso argomento prova anche il seguente risultato speculare al precedente.

TEOREMA 4.2 (°). *Supponiamo che  $\mu, \nu$  siano  $\sigma$ -finite e sia  $f(x, y) : X \times Y \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  una funzione  $(\mu \times \nu)$ -sommabile in  $S \in \mathcal{M}_{\mu \times \nu}$ . Allora:*

- $S_y := \{x \in X \mid (x, y) \in S\} \in \mathcal{M}_\mu$ , per  $\nu$ -q.o.  $y \in Y$ ;
- $x \mapsto f(x, y)$  è  $\mu$ -sommabile in  $S_y$ , per  $\nu$ -q.o.  $y \in Y$ ;
- $y \mapsto \int_{S_y} f(x, y) d\mu(x)$  è  $\nu$ -sommabile;
- vale l'uguaglianza

$$\int_S f d(\mu \times \nu) = \int_Y \left[ \int_{S_y} f(x, y) d\mu(x) \right] d\nu(y).$$

Applicando Teorema 4.1 alle misure di Lebesgue e ricordando Proposizione 4.2, otteniamo subito il seguente risultato.

COROLLARIO 4.1 (°). *Sia  $f(x, y) : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  una funzione  $\mathcal{L}^{m+n}$ -sommabile in  $S \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}^{m+n}}$ . Allora:*

- $S_x := \{y \in \mathbb{R}^n \mid (x, y) \in S\} \in \mathcal{M}_{\mathcal{L}^n}$ , per  $\mathcal{L}^m$ -q.o.  $x \in \mathbb{R}^m$ ;
- $y \mapsto f(x, y)$  è  $\mathcal{L}^n$ -sommabile in  $S_x$ , per  $\mathcal{L}^m$ -q.o.  $x \in \mathbb{R}^m$ ;
- $x \mapsto \int_{S_x} f(x, y) d\mathcal{L}^n(y)$  è  $\mathcal{L}^m$ -sommabile;

- *vale l'uguaglianza*

$$\int_S f d\mathcal{L}^{m+n} = \int_{\mathbb{R}^m} \left[ \int_{S_x} f(x, y) d\mathcal{L}^n(y) \right] d\mathcal{L}^m(x).$$

OSSERVAZIONE 4.2. Usando il punto (9) di Lemma 4.1 e la sottostante Proposizione 4.3, si prova facilmente il seguente risultato sulla “compatibilità misura-integrale”. Siano dati una misura esterna  $\sigma$ -finita  $\mu : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$  e una funzione  $\mu$ -misurabile  $f : X \rightarrow [0, +\infty]$  integrabile in  $\Omega \in \mathcal{M}_\mu$ . Definiamo il sottografico di  $f|_\Omega$ :

$$S_{f|_\Omega} := \{(x, t) \in \Omega \times [0, +\infty] \mid 0 \leq t < f(x)\}.$$

Applicando Proposizione 4.3 in  $(X, \mathcal{M}_\mu, \mu|_{\mathcal{M}_\mu})$ , troviamo una successione di funzioni numerabilmente semplici e misurabili  $s_j : X \rightarrow \mathbb{R}$  tali che  $0 \leq s_j \leq s_{j+1} \leq f$  e  $s_j$  converge puntualmente a  $f$ . Ne consegue facilmente che

$$S_{f|_\Omega} = \bigcup_{j=1}^{\infty} S_{s_j|_\Omega}.$$

Inoltre, per il punto (8) di Lemma 4.1, si ha  $S_{s_j|_\Omega} \in R_\sigma \subset \mathcal{M}_{\mu \times \mathcal{L}^1}$  per ogni  $j$ . Allora  $S_{f|_\Omega} \in \mathcal{M}_{\mu \times \mathcal{L}^1}$ . Grazie al punto (9) di Lemma 4.1, otteniamo che  $S_{f|_\Omega} \in \mathcal{F}$  e

$$(\mu \times \mathcal{L}^1)(S_{f|_\Omega}) = \rho(S_{f|_\Omega}) = \int \mathcal{L}^1((S_{f|_\Omega})_x) d\mu(x) = \int_\Omega \mathcal{L}^1([0, f(x))) d\mu(x)$$

e cioè

$$(\mu \times \mathcal{L}^1)(S_{f|_\Omega}) = \int_\Omega f d\mu.$$

Nel caso speciale  $X = \mathbb{R}^m$  and  $\mu = \mathcal{L}^m$ , ricordando anche Proposizione 4.2, si trova

$$\mathcal{L}^{m+1}(S_{f|_\Omega}) = \int_\Omega f d\mathcal{L}^m.$$

Ecco l'enunciato del teorema di approssimazione appena usato (per una dimostrazione vedasi [8, Theorem 5.24]).

PROPOSIZIONE 4.3. *Siano dati uno spazio con misura  $(X, \mathcal{A}, \alpha)$  e una funzione misurabile  $f : X \rightarrow [0, +\infty]$ . Allora esiste una successione di funzioni numerabilmente semplici e misurabili  $s_j : X \rightarrow \mathbb{R}$  tali che  $Im(s_j)$  è finito,  $0 \leq s_j \leq s_{j+1} \leq f$  e  $s_j$  converge puntualmente a  $f$ .*

## 5. La formula dell'area

**Premessa intuitiva sulle parametrizzazioni.** Esempi di parametrizzazione. Una parametrizzazione “regolare” può avere immagine non “liscia” e una parametrizzazione non “regolare” può avere immagine “liscia”.

[\* Nona settimana (9/11/2015); 54 \*]

Enunciamo ora la definizione rigorosa di parametrizzazione regolare.

DEFINIZIONE 5.1. Siano  $n$  e  $N$  due numeri interi positivi tali che  $n \leq N$ . Allora una “ $(n, N)$ -parametrizzazione regolare” (o semplicemente “parametrizzazione regolare”) è una mappa  $\varphi : C \rightarrow \mathbb{R}^N$  tale che

(i)  $C$  è un sottoinsieme compatto di  $\mathbb{R}^n$  ed esiste un aperto  $A$  in  $\mathbb{R}^n$  soddisfacente

$$C = \bar{A}, \quad \mathcal{L}^n(\partial A) = 0;$$

(ii)  $\varphi|_A$  è iniettiva;

(iii)  $\varphi$  è di classe  $C^1$ , cioè esistono un aperto  $U$  in  $\mathbb{R}^n$  e una mappa  $\Phi \in C^1(U, \mathbb{R}^N)$  tali che

$$C \subset U, \quad \Phi|_C = \varphi;$$

(iv) Per ogni  $x \in A$  si ha

$$J\varphi(x) := \left( \det[D\varphi(x)^t \times D\varphi(x)] \right)^{1/2} \neq 0.$$

Tale funzione è detta “fattore di trasformazione (associato a  $\varphi$ )”.

OSSERVAZIONE 5.1. Nelle ipotesi di Definizione 5.1, si ha evidentemente

$$J\varphi(x) = \left( \det[D\Phi(x)^t \times D\Phi(x)] \right)^{1/2}, \quad x \in A.$$

Pertanto  $J\varphi$  è una funzione uniformemente continua e quindi ammette una unica estensione continua che indicheremo (quando servirà) con la stessa notazione  $J\varphi$ .

OSSERVAZIONE 5.2. Adottiamo la notazione introdotta in Definizione 5.1. Allora:

- Per una  $(1, N)$ -parametrizzazione regolare si ha

$$J\varphi(x) = |\varphi'(x)|, \text{ per ogni } x \in A;$$

- Per una  $(2, 3)$ -parametrizzazione regolare si ha

$$J\varphi(x) = |D_1\varphi(x) \times D_2\varphi(x)|, \text{ per ogni } x \in A;$$

- Per una  $(n, n)$ -parametrizzazione regolare si ha

$$J\varphi(x) = |\det D\varphi(x)|, \text{ per ogni } x \in A.$$

Vale il seguente risultato di cui dimostriamo solo il caso delle superfici ( $n = 2, N = 3$ ).

PROPOSIZIONE 5.1 (\*\*). Sia  $\varphi$  una  $(n, N)$ -parametrizzazione regolare. Allora  $\varphi(A)$  è una sottovarietà  $n$ -dimensionale di  $\mathbb{R}^N$  di classe  $C^1$  (dove  $A$  è come in Definizione 5.1). Se  $x \in A$  allora  $\{D_1\varphi(x), \dots, D_n\varphi(x)\}$  è una base dello spazio tangente a  $\varphi(A)$  nel punto  $\varphi(x)$ .

OSSERVAZIONE 5.3. Considerazioni intuitive ci convincono facilmente del seguente fatto (che si prova rigorosamente combinando la formula dell’area e [13, Theorem 6.27]) concernente le curve:

Se  $C$  è un intervallo compatto di  $\mathbb{R}$  e  $\varphi : C \rightarrow \mathbb{R}^N$  è una  $(1, N)$ -parametrizzazione regolare, allora  $\mathcal{H}^1(\varphi(C))$  coincide con l'estremo superiore della lunghezza delle curve poligonali inscritte in  $\varphi(C)$ .

L'esempio di Schwarz mostra che un fatto analogo non sussiste per le superfici. Infatti esso prova che ogni superficie semicilindrica  $E$  è approssimabile (con arbitrario grado di precisione) mediante superfici poliedrali inscritte in  $E$  e aventi facce “trasversali” alla stessa  $E$ . Ciò consente a tali superfici approssimanti di avere area arbitrariamente grande. In altri termini, l'estremo superiore dell'area delle superfici poliedrali inscritte in  $E$  vale  $+\infty$ .

**Trattazione intuitiva della formula dell'area.** Le seguenti considerazioni si riferiscono esplicitamente a una  $(2, 3)$ -parametrizzazione regolare  $\varphi : C \rightarrow \mathbb{R}^3$ , ma si estendono in modo semplice e naturale a una  $(n, N)$ -parametrizzazione regolare.

L'esempio di Schwarz ci fa capire come sia necessario produrre superfici poliedrali approssimanti aventi le facce che “si dispongono sempre di più in posizione tangente a  $\varphi(C)$ , al crescere del grado di approssimazione”. Descriviamo un modo per farlo:

- Preso  $P_0 \in A$ , siano  $T(\varepsilon)$  e  $T_\varphi(\varepsilon)$ , rispettivamente, il triangolo interno ad  $A$  di vertici  $P_0, P_0 + (\varepsilon, 0), P_0 + (0, \varepsilon)$  e quello inscritto in  $\varphi(C)$  di vertici  $\varphi(P_0), \varphi(P_0 + (\varepsilon, 0)), \varphi(P_0 + (0, \varepsilon))$ . Da

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(P_0 + (\varepsilon, 0)) - \varphi(P_0)}{\varepsilon} = D_1\varphi(P_0), \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(P_0 + (0, \varepsilon)) - \varphi(P_0)}{\varepsilon} = D_2\varphi(P_0)$$

e poiché  $\{D_1\varphi(P_0), D_2\varphi(P_0)\}$  è una base dello spazio tangente a  $\varphi(C)$  in  $\varphi(P_0)$ , concludiamo che il triangolo  $T_\varphi(\varepsilon)$  tende a disporsi “in posizione tangente” a  $\varphi(C)$  in  $\varphi(P_0)$ , quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Inoltre si ha

$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{H}^2(T_\varphi(\varepsilon))}{\mathcal{L}^2(T(\varepsilon))} &= \frac{|[\varphi(P_0 + (\varepsilon, 0)) - \varphi(P_0)] \times [\varphi(P_0 + (0, \varepsilon)) - \varphi(P_0)]|/2}{\varepsilon^2/2} \\ &= \left| \frac{\varphi(P_0 + (\varepsilon, 0)) - \varphi(P_0)}{\varepsilon} \times \frac{\varphi(P_0 + (0, \varepsilon)) - \varphi(P_0)}{\varepsilon} \right| \end{aligned}$$

e quindi (ricordando anche il secondo punto di Osservazione 5.2)

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\mathcal{H}^2(T_\varphi(\varepsilon))}{\mathcal{L}^2(T(\varepsilon))} = |D_1\varphi(P_0) \times D_2\varphi(P_0)| = J\varphi(P_0).$$

Il numero  $J\varphi(P_0)$  può pertanto essere interpretato come “fattore di trasformazione dell'area indotto da  $\varphi$  in  $(P_0)$ ”.

- Consideriamo, nel piano, il reticolo triangolare isoscele-retto di passo  $\varepsilon$  e sia  $\{T_i(\varepsilon) \mid i = 1, \dots, N(\varepsilon)\}$  la famiglia dei triangoli individuati da tale reticolo che sono contenuti in  $A$ . Indichiamo con  $P_i(\varepsilon)$  il vertice del triangolo  $T_i(\varepsilon)$  corrispondente all'angolo retto e sia  $T_{\varphi,i}(\varepsilon)$  il triangolo inscritto in  $\varphi(C)$  di vertici  $\varphi(P_i(\varepsilon))$ ,

$\varphi(P_i(\varepsilon) + (\varepsilon, 0)), \varphi(P_i(\varepsilon) + (0, \varepsilon))$ . Allora la superficie poliedrale

$$\bigcup_{i=1}^{N(\varepsilon)} T_{\varphi,i}(\varepsilon)$$

è inscritta in  $\varphi(C)$  e ha la proprietà “desiderata”: le sue facce “tendono a disporsi in posizione tangente” quando  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Inoltre, se  $f : \varphi(C) \rightarrow \mathbb{R}$  è una funzione continua, si ha

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{N(\varepsilon)} f(\varphi(P_i(\varepsilon))) \mathcal{H}^2(T_{\varphi,i}(\varepsilon)) &= \sum_{i=1}^{N(\varepsilon)} f(\varphi(P_i(\varepsilon))) \frac{\mathcal{H}^2(T_{\varphi,i}(\varepsilon))}{\mathcal{L}^2(T_i(\varepsilon))} \mathcal{L}^2(T_i(\varepsilon)) \\ &= \sum_{i=1}^{N(\varepsilon)} f(\varphi(P_i(\varepsilon))) \delta_i(\varepsilon) \mathcal{L}^2(T_i(\varepsilon)) + \\ &\quad + \sum_{i=1}^{N(\varepsilon)} f(\varphi(P_i(\varepsilon))) J\varphi(P_i(\varepsilon)) \mathcal{L}^2(T_i(\varepsilon)) \end{aligned}$$

dove

$$\delta_i(\varepsilon) := \frac{\mathcal{H}^2(T_{\varphi,i}(\varepsilon))}{\mathcal{L}^2(T_i(\varepsilon))} - J\varphi(P_i(\varepsilon)).$$

La combinazione dei due punti precedenti fornisce uno sketch di prova della formula dell’area per una  $(2, 3)$ -parametrizzazione regolare:

$$\int_{\varphi(C)} f d\mathcal{H}^2 = \int_A (f \circ \varphi) J\varphi d\mathcal{L}^2.$$

Ora possiamo finalmente enunciare efficacemente il teorema generale della formula dell’area, per una dimostrazione completa del quale si rimanda a [6, 7] (per esempio).

**TEOREMA 5.1** (Formula dell’area). *Siano date una  $(n, N)$ -parametrizzazione regolare  $\varphi : C \rightarrow \mathbb{R}^N$  e una funzione continua  $f : \varphi(C) \rightarrow \mathbb{R}$ . Allora vale l’identità*

$$\int_{\varphi(C)} f d\mathcal{H}^n = \int_A (f \circ \varphi) J\varphi d\mathcal{L}^n \left( = \int_C (f \circ \varphi) J\varphi d\mathcal{L}^n \right).$$

**COROLLARIO 5.1** ( $^\circ$ ). *Siano  $\varphi : C \rightarrow \mathbb{R}^N$  e  $\psi : K \rightarrow \mathbb{R}^N$  due  $(n, N)$ -parametrizzazioni regolari aventi la stessa immagine  $E$  (i.e.  $\varphi(C) = \psi(K) = E$ ) e sia  $f : E \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione continua. Allora*

$$\int_C (f \circ \varphi) J\varphi d\mathcal{L}^n = \int_K (f \circ \psi) J\psi d\mathcal{L}^n.$$

Da Teorema 5.1 e dai primi due punti di Osservazione 5.2 segue subito il seguente risultato.

**COROLLARIO 5.2** ( $^\circ$ ). *Valgono i seguenti fatti (dove  $A$  è come in Definizione 5.1):*

- (1) *Se  $\gamma : C \rightarrow \mathbb{R}^N$  è una  $(1, N)$ -parametrizzazione regolare e se  $f : \gamma(C) \rightarrow \mathbb{R}$  è una funzione continua, allora*

$$\int_{\gamma(C)} f d\mathcal{H}^1 = \int_A (f \circ \gamma) |\gamma'| d\mathcal{L}^1;$$

(2) Se  $\varphi : C \rightarrow \mathbb{R}^3$  è una  $(2, 3)$ -parametrizzazione regolare e se  $f : \varphi(C) \rightarrow \mathbb{R}$  è una funzione continua, allora

$$\int_{\varphi(C)} f d\mathcal{H}^2 = \int_A (f \circ \varphi) |D_1\varphi \times D_2\varphi| d\mathcal{L}^2.$$

Da Teorema 5.1, dal terzo punto di Osservazione 5.2 e da (2) in Teorema 2.7 segue poi la seguente formula per il cambiamento di variabile nell'integrale.

**COROLLARIO 5.3** ( $^\circ$ ). Se  $\varphi : C \rightarrow \mathbb{R}^n$  è una  $(n, n)$ -parametrizzazione regolare e se  $f : \varphi(C) \rightarrow \mathbb{R}$  è una funzione continua, allora

$$\int_{\varphi(C)} f d\mathcal{L}^n = \int_A (f \circ \varphi) |\det(D\varphi)| d\mathcal{L}^n$$

dove  $A$  è come in Definizione 5.1.

[\* Decima settimana (16/11/2015); 60 \*]

## 6. Formule di Gauss-Green

Per discutere la nozione di orientazione di una parametrizzazione è utile la seguente definizione

**DEFINIZIONE 6.1.** (1) Se  $\gamma : C \rightarrow \mathbb{R}^N$  ( $C = \bar{A}$ ) è una  $(1, N)$ -parametrizzazione regolare, allora il "campo tangente unitario a  $\gamma$ " è definito come segue:

$$\tau_\gamma : A \rightarrow \mathbb{S}^{N-1}, \quad \tau_\gamma := \frac{\gamma'}{|\gamma'|};$$

(2) Se  $\varphi : C \rightarrow \mathbb{R}^3$  ( $C = \bar{A}$ ) è una  $(2, 3)$ -parametrizzazione regolare, allora "il campo normale a  $\varphi$ " è:

$$\nu_\varphi : A \rightarrow \mathbb{S}^2, \quad \nu_\varphi := \frac{D_1\varphi \times D_2\varphi}{|D_1\varphi \times D_2\varphi|}.$$

**ESEMPIO 6.1.** (1) Per la circonferenza unitaria nel piano, possiamo considerare (per esempio) le seguenti  $(1, 2)$ -parametrizzazioni regolari:

$$\gamma(t) := (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

e

$$\lambda(s) := (\sin s, \cos s), \quad s \in [-3\pi/2, \pi/2].$$

Osserviamo che la mappa  $\sigma : (0, 2\pi) \rightarrow (-3\pi/2, \pi/2)$  definita da  $\sigma(t) := \pi/2 - t$  è un diffeomorfismo di classe  $C^1$ . Inoltre si ha  $\gamma(t) = \lambda \circ \sigma(t)$  per ogni  $t \in (0, 2\pi)$

e

$$\tau_\gamma = -\tau_\lambda \circ \sigma;$$

(2) Per la sfera unitaria in  $\mathbb{R}^3$ , possiamo considerare (per esempio) le seguenti (2, 3)-parametrizzazioni regolari:

$$\varphi(\theta, \gamma) := (\sin \gamma \cos \theta, \sin \gamma \sin \theta, \cos \gamma), \quad (\theta, \gamma) \in [0, 2\pi] \times [0, \pi]$$

e

$$\psi(\alpha, \beta) := (\cos \beta \cos \alpha, \cos \beta \sin \alpha, \sin \beta), \quad (\alpha, \beta) \in [0, 2\pi] \times [-\pi/2, \pi/2].$$

Osserviamo che la mappa  $\sigma : (0, 2\pi) \times (0, \pi) \rightarrow (0, 2\pi) \times (-\pi/2, \pi/2)$  definita da  $\sigma(\theta, \gamma) := (\theta, \pi/2 - \gamma)$  è un diffeomorfismo di classe  $C^1$ . Inoltre si ha  $\varphi(\theta, \gamma) = \psi \circ \sigma(\theta, \gamma)$  per ogni  $(\theta, \gamma) \in (0, 2\pi) \times (0, \pi)$  e

$$\nu_\varphi = -\nu_\psi \circ \sigma.$$

Possiamo ora dare la seguente definizione.

DEFINIZIONE 6.2. *Si considerino due  $(n, N)$ -parametrizzazioni regolari*

$$\varphi : C \rightarrow \mathbb{R}^N, \quad \psi : K \rightarrow \mathbb{R}^N$$

*e si sottintenda la notazione introdotta in Definizione 5.1 ( $C = \bar{A}$  con  $A$  aperto,  $K = \bar{B}$  con  $B$  aperto, eccetera). Allora:*

- (1) *Diremo che “ $\psi$  è equivalente a  $\varphi$ ”, e scriveremo  $\psi \sim \varphi$ , se esiste un diffeomorfismo  $\sigma : A \rightarrow B$  di classe  $C^1$  tale che  $\varphi(x) = \psi \circ \sigma(x)$  per ogni  $x \in A$ ;*
- (2) *Se  $\psi \sim \varphi$  e  $\sigma$  è come in (1), diremo che “ $\varphi$  e  $\psi$  sono equiorientate” tutte le volte che  $\det(D\sigma(x)) > 0$  per ogni  $x \in A$ . Diremo invece che “ $\varphi$  e  $\psi$  sono antiorientate” se  $\det(D\sigma(x)) < 0$  per ogni  $x \in A$ .*

OSSERVAZIONE 6.1. Due  $(n, N)$ -parametrizzazioni equivalenti non possono essere sia equiorientate che antiorientate.

OSSERVAZIONE 6.2. Con riferimento ad Esempio 6.1:

- Le (1, 2)-parametrizzazioni regolari  $\gamma$  e  $\lambda$  sono equivalenti ed antiorientate;
- Le (2, 3)-parametrizzazioni regolari  $\varphi$  e  $\psi$  sono equivalenti ed antiorientate.

La proposizione che segue fornisce la motivazione geometrica del punto (2) in Definizione 6.2, in riferimento ai casi delle curve e delle superfici. Essa si può estendere facilmente al caso generale con l'ausilio di un pò di algebra multilineare.

PROPOSIZIONE 6.1 (\*). *Vale quanto segue:*

(1) *Se*

$$\gamma : C \rightarrow \mathbb{R}^N, \quad \lambda : K \rightarrow \mathbb{R}^N \quad (C = \bar{A}, K = \bar{B})$$

*sono  $(1, N)$ -parametrizzazioni regolari equivalenti e se  $\sigma : A \rightarrow B$  è un diffeomorfismo di classe  $C^1$  tale che  $\gamma = \lambda \circ \sigma$  (in  $A$ ), allora*

$$\tau_\gamma = \text{sign}(\sigma') \tau_\lambda \circ \sigma;$$

(2) Se

$$\varphi : C \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \psi : K \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad (C = \overline{A}, K = \overline{B})$$

sono  $(2,3)$ -parametrizzazioni regolari equivalenti e se  $\sigma : A \rightarrow B$  è un diffeomorfismo di classe  $C^1$  tale che  $\varphi = \psi \circ \sigma$  (in  $A$ ), allora

$$\nu_\varphi = \text{sign}(\det D\sigma) \nu_\psi \circ \sigma.$$

Passiamo ora a definire le nozioni di curva regolare a tratti e di superficie regolare a tratti.

**DEFINIZIONE 6.3.** Si consideri una famiglia finita di  $(1, N)$ -parametrizzazioni regolari

$$\gamma_i : C_i \rightarrow \mathbb{R}^N \quad (i = 1, \dots, k)$$

tali che, posto  $\Gamma_i := \gamma_i(C_i)$ :

- (i)  $C_i$  è un intervallo;
- (ii)  $\Gamma_i \cap \Gamma_j = \partial\Gamma_i \cap \partial\Gamma_j$  per ogni  $i, j$  con  $i \neq j$ .

Allora  $\Gamma := \cup_{i=1}^k \Gamma_i$  è detta “curva regolare a tratti” (risp. “curva regolare”, se  $k = 1$ ). Ogni  $\Gamma_i$  è detto “tratto regolare” di  $\Gamma$ . Inoltre (ricordando che, per Definizione 5.1, esiste un aperto  $A_i$  tale che  $\overline{A_i} = C_i$  eccetera... ) l’insieme  $\Gamma_i^* := \gamma_i(A_i)$  è detto “parte interna” di  $\Gamma_i$ . Infine, se  $\tau$  è il campo vettoriale definito come segue

$$\tau : \cup_{i=1}^k \Gamma_i^* \rightarrow \mathbb{S}^{N-1}, \quad \tau|_{\Gamma_i^*} := \tau_{\gamma_i} \circ (\gamma_i|_{A_i})^{-1}$$

allora la coppia  $(\Gamma, \tau)$  è detta “curva regolare a tratti orientata” e la famiglia  $\{\gamma_i\}$  è detta “parametrizzazione” di  $(\Gamma, \tau)$ .

**DEFINIZIONE 6.4.** Si consideri una famiglia finita di  $(2,3)$ -parametrizzazioni regolari

$$\varphi_i : C_i \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad (i = 1, \dots, k)$$

tali che, posto  $\Sigma_i := \varphi_i(C_i)$ :

- (i)  $\partial C_i$  è una curva regolare a tratti;
- (ii)  $\Sigma_i \cap \Sigma_j = \partial\Sigma_i \cap \partial\Sigma_j$  per ogni  $i, j$  con  $i \neq j$ .

Allora  $\Sigma := \cup_{i=1}^k \Sigma_i$  è detta “superficie regolare a tratti” (risp. “superficie regolare”, se  $k = 1$ ). Ogni  $\Sigma_i$  è detto “tratto regolare” di  $\Sigma$ . Inoltre (ricordando che, per Definizione 5.1, esiste un aperto  $A_i$  tale che  $\overline{A_i} = C_i$  eccetera... ) l’insieme  $\Sigma_i^* := \varphi_i(A_i)$  è detto “parte interna” di  $\Sigma_i$ . Infine, se  $\nu$  è il campo vettoriale definito come segue

$$\nu : \cup_{i=1}^k \Sigma_i^* \rightarrow \mathbb{S}^2, \quad \nu|_{\Sigma_i^*} := \nu_{\varphi_i} \circ (\varphi_i|_{A_i})^{-1}$$

allora la coppia  $(\Sigma, \nu)$  è detta “superficie regolare a tratti orientata” e la famiglia  $\{\varphi_i\}$  è detta “parametrizzazione” di  $(\Sigma, \nu)$ .

OSSERVAZIONE 6.3. Se  $(\Gamma, \tau)$  è una curva regolare a tratti orientata, allora  $\tau$  è continuo nella parte interna di ogni tratto regolare di  $\Gamma$ . Analogamente, se  $(\Sigma, \nu)$  è una superficie regolare a tratti orientata, allora  $\nu$  è continuo nella parte interna di ogni tratto regolare di  $\Sigma$ .

OSSERVAZIONE 6.4. Non è difficile provare che per una  $(n, N)$ -parametrizzazione regolare (con la notazione di Definizione 5.1) si ha  $\partial[\varphi(C)] \subset \varphi(\partial A)$ . Inoltre, poiché per ipotesi si ha  $\mathcal{L}^n(\partial A) = 0$ , la formula dell'area con molteplicità (che generalizza Teorema 5.1 e per la quale rimandiamo a [6]) implica  $\mathcal{H}^n(\varphi(\partial A)) = 0$ . Ne segue che  $\mathcal{H}^n(\partial[\varphi(C)]) = 0$ . Quindi:

- Se  $\Gamma$  è una curva regolare a tratti, allora la frontiera di ogni tratto regolare  $\Gamma_i$  è  $\mathcal{H}^1$ -nulla. Quindi, se per ogni  $i$  si ha una funzione continua e limitata  $f_i : \Gamma_i^* \rightarrow \mathbb{R}$ , allora

$$f : \cup_i \Gamma_i^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad f|_{\Gamma_i^*} := f_i$$

è una funzione definita  $\mathcal{H}^1$ -q.o. in  $\Gamma$  e si ha

$$\int_{\Gamma} f d\mathcal{H}^1 = \sum_i \int_{\Gamma_i^*} f_i d\mathcal{H}^1;$$

- Se  $\Sigma$  è una superficie regolare a tratti, allora la frontiera di ogni tratto regolare  $\Sigma_i$  è  $\mathcal{H}^2$ -nulla. Quindi, se per ogni  $i$  si ha una funzione continua e limitata  $f_i : \Sigma_i^* \rightarrow \mathbb{R}$ , allora

$$f : \cup_i \Sigma_i^* \rightarrow \mathbb{R}, \quad f|_{\Sigma_i^*} := f_i$$

è una funzione definita  $\mathcal{H}^2$ -q.o. in  $\Sigma$  e si ha

$$\int_{\Sigma} f d\mathcal{H}^2 = \sum_i \int_{\Sigma_i^*} f_i d\mathcal{H}^2.$$

Grazie a Osservazione 6.3 e a Osservazione 6.4 si può dare la seguente definizione.

DEFINIZIONE 6.5. *Dati una curva regolare a tratti orientata  $(\Gamma, \tau)$  in  $\mathbb{R}^N$  e un campo continuo  $F : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}^N$ , si definisce l'“integrale di  $F$  su  $(\Gamma, \tau)$ ” come segue:*

$$\int_{(\Gamma, \tau)} F := \int_{\Gamma} F \cdot \tau d\mathcal{H}^1.$$

*Analogamente, dati una superficie regolare a tratti orientata  $(\Sigma, \nu)$  e un campo continuo  $F : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ , si definisce l'“integrale di  $F$  su  $(\Sigma, \nu)$ ” come segue:*

$$\int_{(\Sigma, \nu)} F := \int_{\Sigma} F \cdot \nu d\mathcal{H}^2.$$

Da Definizione 6.3, Definizione 6.4 e Definizione 6.5 segue subito il seguente risultato.

PROPOSIZIONE 6.2 (\*). Sia  $(\Gamma, \tau)$  una curva regolare a tratti orientata in  $\mathbb{R}^N$  e sia  $F : \Gamma \rightarrow \mathbb{R}^N$  un campo continuo. Allora, se  $\{\gamma_i\}$  è una parametrizzazione di  $(\Gamma, \tau)$ , si ha:

$$\int_{(\Gamma, \tau)} F = \sum_i \int_{A_i} (F \circ \gamma_i) \cdot \gamma'_i d\mathcal{L}^1.$$

Analogamente, sia  $(\Sigma, \nu)$  una superficie regolare a tratti orientata e sia  $F : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$  un campo continuo. Allora, se  $\{\varphi_i\}$  è una parametrizzazione di  $(\Sigma, \nu)$ , si ha:

$$\int_{(\Sigma, \nu)} F = \sum_i \int_{A_i} (F \circ \varphi_i) \cdot (D_1\varphi_i \times D_2\varphi_i) d\mathcal{L}^2.$$

DEFINIZIONE 6.6. Un sottoinsieme  $E$  di  $\mathbb{R}^2$  è detto “ $x_2$ -semplice” se esistono due funzioni continue

$$f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \quad (-\infty < a < b < +\infty)$$

con le seguenti proprietà:

- (i)  $E = \{x \in [a, b] \times \mathbb{R} \mid f(x_1) \leq x_2 \leq g(x_1)\}$  (in particolare  $E$  è compatto);
- (ii) Esistono  $a_i \in [a, b]$  ( $i = 0, \dots, k$ ) con  $a_0 = a$ ,  $a_k = b$  e  $a_i < a_{i+1}$  tali che le funzioni  $f|_{[a_i, a_{i+1}]}$  e  $g|_{[a_i, a_{i+1}]}$  sono di classe  $C^1$  (per  $i = 0, \dots, k-1$ ).

In modo del tutto analogo si definiscono gli insiemi  $x_1$ -semplici. Un sottoinsieme di  $\mathbb{R}^2$  si dice “semplice” se esso è  $x_i$ -semplice per  $i = 1, 2$ . Infine chiameremo “insieme composto” ogni unione finita di insiemi semplici  $E_i$  tali che  $E_i \cap E_j = \partial E_i \cap \partial E_j$  per ogni  $i, j$  con  $i \neq j$ .

DEFINIZIONE 6.7. Un sottoinsieme  $E$  di  $\mathbb{R}^3$  è detto “ $x_3$ -semplice” se esistono una famiglia finita  $\{C_1, \dots, C_k\}$  di sottoinsiemi compatti di  $\mathbb{R}^2$  e due funzioni continue

$$f, g : C \rightarrow \mathbb{R}, \quad C := C_1 \cup \dots \cup C_k$$

tali che:

- (i)  $E = \{x \in C \times \mathbb{R} \mid f(x_1, x_2) \leq x_3 \leq g(x_1, x_2)\}$  (in particolare  $E$  è compatto);
- (ii) Ogni  $C_i$  è la chiusura di un aperto la cui frontiera è una curva regolare a tratti;
- (iii)  $C_i \cap C_j = \partial C_i \cap \partial C_j$  per ogni  $i, j$  con  $i \neq j$ ;
- (iv) Per ogni  $i$ , le funzioni  $f|_{C_i}$  e  $g|_{C_i}$  sono di classe  $C^1$ .

In modo del tutto analogo si definiscono gli insiemi  $x_1$ -semplici e gli insiemi  $x_2$ -semplici. Un sottoinsieme di  $\mathbb{R}^3$  si dice “semplice” se esso è  $x_i$ -semplice per  $i = 1, 2, 3$ . Infine chiameremo “insieme composto” ogni unione finita di insiemi semplici  $E_i$  tali che  $E_i \cap E_j = \partial E_i \cap \partial E_j$  per ogni  $i, j$  con  $i \neq j$ .

OSSERVAZIONE 6.5. Se  $E$  è un sottoinsieme composto di  $\mathbb{R}^2$  (risp.  $\mathbb{R}^3$ ), allora  $\partial E$  è una curva (risp. superficie) regolare a tratti. Pertanto ogni funzione continua nelle parti interne dei tratti regolari di  $\partial E$  risulta essere integrabile in  $\partial E$ .

Possiamo finalmente enunciare e provare il teorema relativo alle formule di Gauss-Green in  $\mathbb{R}^3$  (Teorema di Gauss della divergenza).

TEOREMA 6.1 (\*\*). *Sia  $E$  un sottoinsieme composto di  $\mathbb{R}^3$  e sia  $\nu$  il campo di vettori normali esterni definito nelle parti interne dei tratti regolari di  $\partial E$ . Allora per ogni funzione  $h : E \rightarrow \mathbb{R}$  di classe  $C^1$  vale l'identità*

$$\int_E D_i h \, d\mathcal{L}^3 = \int_{\partial E} h \nu_i \, d\mathcal{H}^2 \quad (i = 1, 2, 3).$$

Quindi, se  $F : E \rightarrow \mathbb{R}^3$  è un campo vettoriale di classe  $C^1$ , si ha

$$\int_E \operatorname{div} F \, d\mathcal{L}^3 = \int_{\partial E} F \cdot \nu \, d\mathcal{H}^2.$$

Poiché  $(\partial E, \nu)$  è una superficie regolare a tratti orientata, quest'ultima identità si può riscrivere come segue:

$$\int_E \operatorname{div} F \, d\mathcal{L}^3 = \int_{(\partial E, \nu)} F.$$

Lo stesso argomento prova anche il seguente teorema di Green nel piano.

TEOREMA 6.2 (\*). *Si consideri un sottoinsieme composto  $E$  di  $\mathbb{R}^2$ . Sia  $\tau_E = (\tau_{E,1}, \tau_{E,2})$  il campo di vettori unitari tangenti a  $\partial E$  continuo nelle parti interne dei tratti regolari e tale che  $\nu_E := (\tau_{E,2}, -\tau_{E,1})$  sia il campo di vettori normali esterni a  $\partial E$ . Allora per ogni funzione  $h : E \rightarrow \mathbb{R}$  di classe  $C^1$  vale l'identità*

$$\int_E D_i h \, d\mathcal{L}^2 = \int_{\partial E} h \nu_{E,i} \, d\mathcal{H}^1 \quad (i = 1, 2).$$

Quindi, se  $F : E \rightarrow \mathbb{R}^2$  è un campo vettoriale di classe  $C^1$ , si ha

$$\int_E \operatorname{div} F \, d\mathcal{L}^2 = \int_{\partial E} F \cdot \nu_E \, d\mathcal{H}^1.$$

Infine  $(\partial E, \tau_E)$  è una curva regolare a tratti orientata e

$$\int_{(\partial E, \tau_E)} F = \int_E (D_1 F_2 - D_2 F_1) \, d\mathcal{L}^2.$$

OSSERVAZIONE 6.6. Sia  $\varphi : C \rightarrow \mathbb{R}^3$  una  $(2, 3)$ -parametrizzazione regolare ( $C = \bar{A}$ , con la notazione di Definizione 5.1). Consideriamo un sottoinsieme composto  $E$  di  $A$  e definiamo il campo vettoriale  $\tau_E$  come in Teorema 6.2. Sappiamo allora che  $(\partial E, \tau_E)$  è una curva regolare a tratti orientata. Sia  $\{\gamma_i : [a_i, b_i] \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid i = 1, \dots, k\}$  una sua parametrizzazione e sia  $(S, \nu)$  la superficie regolare orientata determinata da  $\varphi|_E$ , i.e.

$$S := \varphi(E), \quad \nu := \nu_\varphi \circ (\varphi|_E)^{-1}.$$

Osserviamo che ogni  $\varphi \circ \gamma_i$  è una  $(1, 3)$ -parametrizzazione regolare e la famiglia  $\{\varphi \circ \gamma_i\}$  soddisfa le ipotesi di Definizione 6.3. Pertanto tale famiglia genera una curva regolare a tratti orientata  $(\Gamma, \tau)$ , dove

$$\Gamma = \bigcup_{i=1}^k (\varphi \circ \gamma_i)([a_i, b_i]) = \varphi \left( \bigcup_{i=1}^k \gamma_i([a_i, b_i]) \right) = \varphi(\partial E) = \partial S$$

e, per ogni  $i = 1, \dots, k$

$$\tau \circ (\varphi \circ \gamma_i)(t) = \frac{(\varphi \circ \gamma_i)'(t)}{|(\varphi \circ \gamma_i)'(t)|}, \quad t \in (a_i, b_i).$$

Vale il seguente teorema di Stokes.

**TEOREMA 6.3 (\*\*).** *Nelle ipotesi e con la notazione di Osservazione 6.6, se  $U$  è un sottoinsieme aperto di  $\mathbb{R}^3$  contenente  $S$  e se  $F \in C^1(U, \mathbb{R}^3)$  allora si ha*

$$\int_{(S, \nu)} \text{rot } F = \int_{(\partial S, \tau)} F$$

e quindi anche

$$\int_{(S, -\nu)} \text{rot } F = \int_{(\partial S, -\tau)} F.$$



## CHAPTER 3

### Spazi $L^p$ e serie di Fourier

[\* Dodicesima settimana (30/11/2015); 72 \*]

#### 1. Spazi $L^p$

OSSERVAZIONE 1.1. Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura e sia  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  una funzione misurabile. Indichiamo allora con  $\mathcal{M}_f$  l'insieme dei maggioranti essenziali di  $|f|$  e cioè:

$$\mathcal{M}_f := \{M \geq 0 \mid M \geq |f(x)| \text{ per } \mu\text{-q.o. } x\} = \{M \geq 0 \mid \mu(\{x \mid M < |f(x)|\}) = 0\}.$$

Allora valgono i seguenti fatti:

- $\mathcal{M}_f$  è una semiretta destra;
- $\mathcal{M}_f$  è chiusa, i.e.  $\inf \mathcal{M}_f \in \mathcal{M}_f$ .

DEFINIZIONE 1.1. Siano  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura e  $p \in [1, +\infty]$ . Per ogni funzione misurabile  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ , poniamo

$$\|f\|_p := \begin{cases} (\int_X |f|^p d\mu)^{1/p} & \text{se } 1 \leq p < +\infty, \\ \min \mathcal{M}_f & \text{se } p = +\infty. \end{cases}$$

Indicheremo con  $L^p(X)$  la classe delle funzioni misurabili  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  tali che  $\|f\|_p < \infty$ .

TEOREMA 1.1 (\*). Siano  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  spazio con misura,  $p \in [1, +\infty]$  e  $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  misurabile. Allora

- (1)  $\|f\|_p \geq 0$ ;
- (2)  $\|f\|_p = 0$  se e solo se  $f = 0$  quasi ovunque (rispetto a  $\mu$ );
- (3)  $\|cf\|_p = |c| \|f\|_p$ , per ogni  $c \in \mathbb{R}$ .

TEOREMA 1.2 (Disuguaglianza di Hölder (\*\*)). Sia  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  uno spazio con misura e siano  $f, g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  due funzioni misurabili. Allora

$$\int_X |fg| d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}$$

dove  $p, p' \in [1, +\infty]$  sono coniugati, cioè verificano una fra le seguenti ipotesi alternative:

- (i)  $p = 1$  e  $p' = +\infty$  (o viceversa);

(ii)  $p, p' \in (1, +\infty)$  e

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

TEOREMA 1.3 (\*\*). *Siano  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  spazio con misura e  $p \in [1, +\infty]$ . Allora, per ogni coppia di funzioni  $f, g \in L^p(X)$ , vale la disuguaglianza triangolare*

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p \quad (\text{Disuguaglianza di Minkowski}).$$

OSSERVAZIONE 1.2. Facendo il quoziente di  $L^p(X)$  rispetto alla relazione di equivalenza

$$f \sim g \quad \text{se e solo se} \quad f = g \text{ q.o. (rispetto a } \mu)$$

si ottiene in modo naturale uno spazio vettoriale. Inoltre la funzione

$$(1.1) \quad L^p(X)/\sim \rightarrow [0, +\infty), \quad [f] \mapsto \|f\|_p$$

è una norma. Per semplificare la notazione, denoteremo tale spazio vettoriale ancora con  $L^p(X)$  e identificheremo  $[f]$  con  $f$  tutte le volte in cui la formula non dipende dalla scelta della funzione nella classe di equivalenza. Per questo motivo indicheremo la norma (1.1) della classe di equivalenza di  $f$  ancora con  $\|f\|_p$ .

TEOREMA 1.4 (Fisher-Riesz (\*\*\*)). *Siano  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  spazio con misura e  $p \in [1, +\infty]$ . Allora lo spazio vettoriale normato  $L^p(X)$  è uno spazio di Banach.*

[\* Tredicesima settimana (09/12/2015); 76 \*]

Dalla dimostrazione di Teorema 1.4 segue subito il seguente risultato, che enunciamo senza ricorrere alla semplificazione notazionale descritta in Osservazione 1.2.

PROPOSIZIONE 1.1 (°). *Siano  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  spazio con misura e  $p \in [1, +\infty]$ . Allora ogni successione  $\{f_j\} \subset L^p(X)$  tale che  $\{[f_j]\}$  converge in  $L^p(X)/\sim$  ha una sottosuccessione convergente  $\mu$ -q.o. a una funzione di  $L^p(X)$ .*

OSSERVAZIONE 1.3. In generale una successione convergente in  $L^p(X)$  non converge q.o., fatta eccezione per il caso  $p = +\infty$  (esempio della “tendina”).

## 2. Serie di Fourier in uno spazio di Hilbert, un prontuario minimo (meno di così non si può...)

Introdurremo di seguito qualche elemento di teoria degli spazi di Hilbert (il minimo indispensabile per la trattazione delle serie di Fourier che ci siamo dati come obiettivo della parte finale del corso).

PROPOSIZIONE 2.1 (\*). *Se  $V$  è uno spazio vettoriale con un prodotto scalare  $(\cdot, \cdot)$ , allora la funzione*

$$v \mapsto \|v\| := (v, v)^{1/2}, \quad v \in V$$

*è una norma in  $V$  ed è della “la norma indotta dal prodotto scalare  $(\cdot, \cdot)$ ”.*

DEFINIZIONE 2.1. Uno “spazio di Hilbert” è uno spazio di Banach in cui la norma è indotta da un prodotto scalare.

OSSERVAZIONE 2.1. Se  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  è uno spazio con misura, la norma  $\|\cdot\|_2$  è indotta dal prodotto scalare

$$(f, g) := \int_X fg \, d\mu \quad (f, g \in L^2(X)).$$

Allora  $L^2(X)$  (con  $\|\cdot\|_2$ ) è uno spazio di Hilbert.

DEFINIZIONE 2.2. Sia  $H$  uno spazio di Hilbert. Allora un sottoinsieme  $F$  di  $H$  è detto “famiglia ortonormale (in  $H$ )” se per ogni  $x, y \in F$  si ha

$$(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \neq y \\ 1 & \text{se } x = y. \end{cases}$$

Una “famiglia ortonormale completa (in  $H$ )” è una famiglia ortonormale  $F$  che soddisfa la seguente condizione: se  $h \in H$  è tale che  $(h, x) = 0$  per ogni  $x \in F$  allora si ha  $h = 0$ .

PROPOSIZIONE 2.2 (\*). Sia  $F$  una famiglia ortonormale in uno spazio di Hilbert  $H$  e si indichi con  $\Gamma$  lo spazio vettoriale delle combinazioni lineari finite di elementi di  $F$ . Se  $\Gamma$  è denso in  $H$  allora  $F$  è una famiglia ortonormale completa.

Come applicazione del Lemma di Zorn si prova facilmente l’esistenza di famiglie ortonormali complete, e.g. [8, Theorem 8.44].

TEOREMA 2.1. Ogni spazio di Hilbert  $H$  contiene una famiglia ortonormale completa. Se  $H$  è separabile allora ogni famiglia ortonormale (in particolare, ogni famiglia ortonormale completa) è numerabile.

TEOREMA 2.2 (\*\*). Sia  $F = \{u_1, u_2, \dots\}$  una famiglia ortonormale numerabile in uno spazio di Hilbert  $H$ . Valgono allora i seguenti fatti:

- (1) Se  $h \in H$  e  $c_1, c_2, \dots$  sono numeri reali, si ha

$$\left\| h - \sum_{i=1}^m (h, u_i) u_i \right\| \leq \left\| h - \sum_{i=1}^m c_i u_i \right\|$$

per ogni  $m \geq 1$ . Inoltre l’uguaglianza vale se e solo se  $c_i = (h, u_i)$ , per  $i = 1, \dots, m$ ;

- (2) Per ogni  $h \in H$  si ha  $\sum_i (h, u_i)^2 \leq \|h\|^2$  (disuguaglianza di Bessel);
- (3) Siano  $c_1, c_2, \dots$  numeri reali. Allora  $\sum_i c_i u_i$  converge in  $H$  se e soltanto se  $\sum_i c_i^2 < +\infty$ . In particolare, per ogni  $h \in H$ , la serie  $\sum_i (h, u_i) u_i$  converge in  $H$ ;
- (4) Se  $F$  è completa, per ogni  $h \in H$  si ha  $\sum_i (h, u_i) u_i = h$ . In particolare la serie  $\sum_i (h, u_i) u_i$  converge incondizionatamente, cioè la sua somma non dipende dall’ordine dei suoi addendi.

[\* Quattordicesima settimana (14/12/2015); 84 \*]

Un'importante applicazione della teoria precedente si ottiene considerando lo spazio con misura  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  indotto dalla misura esterna  $\mathcal{L}^1 \llcorner (-\pi, \pi)$  e prendendo il corrispondente spazio di Hilbert  $H := L^2(-\pi, \pi)$ , cfr. Osservazione 2.1. Si tratta della cosiddetta “teoria  $L^2$  delle serie di Fourier” che qui descriveremo sommariamente.

Prima di tutto è facile provare che il “sistema trigonometrico”

$$(2.1) \quad F := \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right\} \cup \left\{ \frac{\cos nt}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nt}{\sqrt{\pi}} \right\}_{n=1}^{\infty}$$

è una famiglia ortonormale in  $L^2(-\pi, \pi)$ . Da Teorema 2.2 si ottiene allora che per ogni  $f \in L^2(-\pi, \pi)$  la “serie di Fourier di  $f$ ” definita come segue

$$(2.2) \quad \frac{1}{2\pi}(f, 1) + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{1}{\pi}(f, \cos nt) \cos nt + \frac{1}{\pi}(f, \sin nt) \sin nt \right]$$

converge in  $L^2(-\pi, \pi)$ .

In realtà l'insieme  $F$  definito in (2.1) è una famiglia ortonormale completa. Questo fatto si può dimostrare utilizzando i seguenti due risultati di approssimazione, che enunciamo soltanto. Il primo si ottiene per regolarizzazione mediante prodotto di convoluzione [1, Corollario IV.23], mentre il secondo è una conseguenza del Teorema di Stone-Weierstrass [5, 15].

**TEOREMA 2.3.** *Lo spazio vettoriale  $C_c(-\pi, \pi)$  è denso in  $(L^2(-\pi, \pi), \|\cdot\|_2)$ .*

**TEOREMA 2.4.** *Sia  $\varphi \in C(K)$ , con  $K$  un sottoinsieme compatto di  $\mathbb{R}^n$ . Allora per ogni  $\varepsilon > 0$  esiste un polinomio  $P : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  tale che  $\sup_K |\varphi - P| \leq \varepsilon$ .*

Infatti, da Teorema 2.3 e Teorema 2.4 otteniamo:

**COROLLARIO 2.1 (\*\*).** *Le combinazioni lineari finite di elementi del sistema trigonometrico (2.1) formano uno spazio vettoriale denso in  $(L^2(-\pi, \pi), \|\cdot\|_2)$ . Quindi, per Proposizione 2.2, il sistema trigonometrico è una famiglia ortonormale completa.*

Da Corollario 2.1 e Teorema 2.2(4) segue ora subito il seguente risultato.

**COROLLARIO 2.2 (°).** *Per ogni  $f \in L^2(-\pi, \pi)$ , la serie di Fourier (2.2) converge incondizionatamente a  $f$  in  $(L^2(-\pi, \pi), \|\cdot\|_2)$ .*

Combinando Corollario 2.2 e Proposizione 1.1, otteniamo:

COROLLARIO 2.3 (°). Se  $f \in L^2(-\pi, \pi)$ , allora esiste una sottosuccessione di

$$(2.3) \quad S_N(t) := \frac{1}{2\pi}(f, 1) + \sum_{n=1}^N \left[ \frac{1}{\pi}(f, \cos nt) \cos nt + \frac{1}{\pi}(f, \sin nt) \sin nt \right]$$

che converge puntualmente quasi ovunque in  $(-\pi, \pi)$  alla funzione  $f$ .

OSSERVAZIONE 2.2. Nel 1915 Lusin pose la questione della convergenza quasi ovunque di “tutta” la successione (2.3). La risposta affermativa venne oltre cinquant’anni dopo, in un profondo lavoro di Lennart Carleson [2].

### 3. Convergenza puntuale della serie di Fourier per una funzione regolare a tratti

Per questa ultima parte del corso, la bibliografia di riferimento è il secondo capitolo dell’opera [9].

DEFINIZIONE 3.1. Sia data una funzione  $2\pi$ -periodica  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Allora:

- (i)  $f$  è detta “continua a tratti” se
- L’insieme  $D$  dei punti di discontinuità di  $f$  in  $[-\pi, \pi)$  è vuoto o finito
  - per ogni  $x_0 \in D$  esistono finiti i limiti sinistro e destro

$$f(x_0 - 0) := \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \quad f(x_0 + 0) := \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x);$$

- (ii)  $f$  è detta “regolare a tratti” se:
- è continua a tratti secondo la descrizione data in (i);
  - esiste un sottoinsieme finito  $E$  di  $[-\pi, \pi)$  tale che  $E \supset D$  e  $f$  ha derivata continua ed equilimitata in  $[-\pi, \pi) \setminus E$ .

Vale il seguente risultato sulla convergenza puntuale e sulla convergenza puntuale uniforme.

TEOREMA 3.1. Sia  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione  $2\pi$ -periodica e regolare a tratti. Allora:

- (1) Per ogni  $x \in \mathbb{R}$ , la serie di Fourier di  $f$  in  $x$  è uguale a

$$\frac{f(x - 0) + f(x + 0)}{2}.$$

In particolare, se  $f$  è continua in  $x$ , allora la serie di Fourier di  $f$  in  $x$  è uguale a  $f(x)$ .

- (2) Se  $f$  è continua, la sua serie di Fourier converge totalmente in  $L^\infty(\mathbb{R})$  (e quindi uniformemente) a  $f$ .

OSSERVAZIONE 3.1. Consideriamo una funzione  $2\pi$ -periodica e continua a tratti  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Allora possiamo scrivere la serie di Fourier di  $f$ :

$$(3.1) \quad \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (x \in \mathbb{R})$$

dove

$$a_n := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \, dt \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

e

$$b_n := \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \, dt \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Si vede subito che:

(1) Se  $f$  è dispari, la (3.1) è una “serie di soli seni”, cioè  $a_n = 0$  per ogni  $n$  e si ha

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \sin nt \, dt \quad (n = 1, 2, \dots);$$

(2) Se  $f$  è pari, la (3.1) è una “serie di soli coseni”, cioè  $b_n = 0$  per ogni  $n$  e si ha

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(t) \cos nt \, dt \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

OSSERVAZIONE 3.2. Naturalmente la teoria della serie di Fourier che abbiamo presentato per le funzioni  $2\pi$ -periodiche può essere “riformulata” per le funzioni  $2L$ -periodiche: basta rifare tutto applicando i risultati astratti allo spazio di Hilbert  $H := L^2(-L, L)$ , dove lo spazio con misura considerato stavolta è quello indotto da  $\mathcal{L}^1 \llcorner (-L, L)$ . Per cominciare, il sistema trigonometrico da utilizzare in questo caso è

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2L}} \right\} \cup \left\{ \frac{1}{\sqrt{L}} \cos \frac{\pi}{L} nt, \frac{1}{\sqrt{L}} \sin \frac{\pi}{L} nt \right\}_{n=1}^{\infty}.$$

Eccetera.

OSSERVAZIONE 3.3. Dalle serie di Fourier di può ottenere una funzione continua in  $\mathbb{R}$  (e  $2\pi$ -periodica) che non è derivabile in alcun punto, si veda per esempio [10, Cap. 2, Sez. 6].

## Bibliography

- [1] H. Brezis: *Analisi funzionale, teoria e applicazioni*. Liguori Editore 1986.
- [2] L. Carleson: On convergence and growth of partial sums of Fourier series. *Acta Math.* **116**, 135-157 (1966).
- [3] L.C. Evans, R.F. Gariepy: *Lecture Notes on Measure Theory and Fine Properties of Functions*. (Studies in Advanced Math.) CRC Press 1992.
- [4] K.J. Falconer: *The geometry of fractal sets*. (Cambridge Tracts in Math. 85.) Cambridge University Press 1985.
- [5] M. Giaquinta, G. Modica: *Analisi Matematica 3; strutture lineari e metriche, continuità*. Pitagora Ed. Bologna 2000.
- [6] M. Giaquinta, G. Modica: *Analisi Matematica 4; funzioni di più variabili*. Pitagora Ed. Bologna 2005.
- [7] M. Giaquinta, G. Modica: *Analisi Matematica 5; funzioni di più variabili (ulteriori sviluppi)*. Pitagora Ed. Bologna 2005.
- [8] R.F. Gariepy, W.P. Ziemer: *Modern real analysis*. PSW Publishing Company 1995.
- [9] E. Giusti: *Analisi matematica 2*. Bollati Boringhieri 2003.
- [10] E. Giusti: *Esercizi e complementi di analisi matematica, volume secondo*. Bollati Boringhieri 2000.
- [11] P. Mattila: *Geometry of sets and measures in Euclidean spaces*. Cambridge University Press 1995.
- [12] H.L. Royden: *Real Analysis*. Prentice Hall College 1988.
- [13] W. Rudin: *Principles of mathematical analysis*. McGraw-Hill 1976.
- [14] S.M. Srivastava: *A course on Borel sets*. Graduate Texts in Mathematics 180, Springer Verlag 1998.
- [15] <http://en.wikipedia.org/wiki/Stone-Weierstrass>