

## 2 Esercizi su calcolo combinatorio, divisibilità e congruenze

a cura di Michela Pagliacci

I seguenti esercizi sono riferiti agli argomenti svolti nelle lezioni di esercitazione del 16.05.2002 e del 23.05.2002

1. Per ogni  $n \in \mathbb{Z}^+$  si definisca  $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$  e

$S_n = \{T \subseteq [n] \text{ tale che } T \text{ non contiene due interi consecutivi}\}.$

a) Dimostrare che  $|S_n|$  è l' $n$ -esimo numero di Fibonacci, ovvero che  $|S_n| = f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ , per ogni  $n \geq 2$ , con  $f(0) = 1$  e  $f(1) = 2$

b) Dimostrare per induzione su  $n$  che  $f(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+2} - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+2} \right]$ , dove  $f(0) = 1$  e  $f(1) = 2$  per il punto a).

2. Dimostrare per induzione su  $n$  che  $\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$  per ogni  $n \geq 1$ .

3. Dimostrare che  $\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m}$ , per ogni  $n, m \in \mathbb{N}$  con  $m \leq n$ .

4. Dimostrare che  $\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$ , per ogni  $n, m \in \mathbb{N}$  con  $m \leq n$ .

5. Dimostrare usando la definizione di coefficiente binomiale che:  
 $n^2 = \binom{n}{2} + \binom{n+1}{2}$ , per ogni  $n \in \mathbb{N}$

6. Dare un'interpretazione combinatoria, ovvero trovare una biiezione fra insiemi di cardinalità opportuna, della seguente uguaglianza:

$$n^2 = \frac{n!}{(n-2)!} + n$$

[Sugg. Pensare a come possono essere le funzioni da un insieme di 2 elementi ad uno di  $n$  elementi]

7. Si consideri la successione definita per ricorsione da:

$$\begin{cases} f(n+2) = 3f(n+1) + 4f(n) \\ f(0) = -1 \\ f(1) = 3 \end{cases}$$

Dimostrare che per induzione su  $n$  che  $f(n)$  è dispari per ogni  $n$ .

Dimostrare per induzione su  $n$  che  $f(n) = \frac{1}{5} [7(-1)^{n+1} + \frac{1}{2}4^{n+1}]$

8. Si consideri la successione definita per ricorsione da:

$$\begin{cases} f(n+2) = 3f(n+1) + f(n) \\ f(0) = 1 \\ f(1) = 3 \end{cases}$$

Dimostrare che  $(f(n+2), f(n+1)) = 1$ .

9. Quale parola di 13 lettere dà luogo al maggior numero di anagrammi?  
Quale al minor numero?

10. Calcolare, utilizzando l'algoritmo di Euclide, i seguenti:

- $(26, 19)$  [risp. 1];
- $(187, 34)$  [risp. 17];
- $(841, 160)$  [risp. 1];
- $(2613, 2171)$  [risp. 13];
- $(1547, 560)$  [risp.7];
- $(2784, 356)$  [risp.4].

11. Quanti sono i divisori di 345? Elencarli tutti.  
Calcolare  $\Phi(345)$ .

12. Ha più divisori 345 o 225?

13. Trovare  $\Phi(m)$  per ogni  $m$  da 90 a 100.

14. Trovare, se esiste, una soluzione delle seguenti congruenze lineari:

- a)  $31x \equiv 15 \pmod{81}$
- b)  $103x \equiv 612 \pmod{676}$
- c)  $27x \equiv 25 \pmod{256}$
- d)  $27x \equiv 72 \pmod{384}$
- e)  $51x \equiv 99 \pmod{102}$
- f)  $9x \equiv 12 \pmod{21}$

15. Trovare una soluzione delle seguenti congruenze:

- a)  $x^3 \equiv 2 \pmod{11}$
- b)  $x^9 \equiv 5 \pmod{23}$
- c)  $x^5 \equiv 16 \pmod{27}$

16. Trovare, se possibile, la minima soluzione positiva dei seguenti sistemi di congruenze:

a) 
$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 5 \pmod{16} \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} x \equiv 12 \pmod{31} \\ x \equiv 87 \pmod{127} \\ x \equiv 91 \pmod{255} \end{cases}$$

c) 
$$\begin{cases} x \equiv 103 \pmod{900} \\ x \equiv 511 \pmod{841} \end{cases}$$

d) 
$$\begin{cases} x \equiv 17 \pmod{27} \\ x \equiv 41 \pmod{42} \end{cases}$$

17. Trovare il più piccolo intero positivo che dà resto 1 quando diviso per 11, resto 2 quando diviso per 12 e resto 3 quando diviso per 13.

18. Calcolare, se esiste l'inverso di:

- $12 \pmod{27}$
- $12 \pmod{36}$
- $9 \pmod{11}$

19. Elencare gli elementi invertibili di  $\mathbb{Z}_{15}$ .  
Calcolare se esiste l'inverso di  $7 \pmod{15}$ .